

[使用上の注意]**[してはいけないこと]**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

[相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 次の症状のある人。

口内のひどいだれ

(3) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関節部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (ハイポキニン)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

発 売 元 カイゲンファーマ株式会社
大阪市中央区道修町二丁目5番14号
お客様相談室 ☎ 06-6202-8911
受付9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1丁目4番12号

KAIGEN

のどの殺菌 消毒 口臭除去に



爽やかなユーカリの香り うがい薬 / ポビドンヨード製剤

300mL
ガーグルフレッシュ

第3類医薬品

[効能・効果]

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

[用法・用量]

1回、本剤2~4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいてください。

<用法・用量に関する注意>

1. 用法及び用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。うがい薬をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
3. うがい用にのみ使用し、キズややけどへの使用や内服しないでください。
4. 本剤は使用するときにうすめて、早めに使用してください。

[成分・分量]

本品 1mL中ポビドンヨード 7.0mg
(有効ヨウ素 7mg含有)

添加物として、エタノール、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム水和物、ユーカリ油を含む。

<成分・分量に関する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

[保管及び取扱い上の注意]

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 衣類等に付着したときはすぐに洗い流してください。
- ご使用後はすぐに洗面台等を水で洗い流してください。（そのまま放置すると、洗面台等が変色することがあります。）
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

[使用方法]

1. 用法

本剤を2と1の割合で入れる。

2. 用量

水60の1まで加え、うがいてからうがいする。



ボトル
キャップ
コップ
フィルム