

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

花粉・ハウスダストなどの目のアレルギー症状に\*

\*目のかゆみ、充血、異物感、なみだ目



# ビュークリア AG フレッシュ

眼科用薬

## [特徴] 6種の有効成分を最大濃度\*配合。

- 抗アレルギー成分（クロモグリク酸ナトリウム）、抗ヒスタミン成分（クロルフェニラミンマレイン酸塩）に加え、2種類の消炎成分（アズレンスルホン酸ナトリウム、グリチルリチン酸二カリウム）、角膜保護成分（コンドロイチン硫酸エステルナトリウム）、栄養補給成分（ビリドキシン塩酸塩）を配合
- シリーズ内最大濃度配合\*した有効成分がトータルにはたらき、つらい花粉やハウスダスト等によるアレルギー症状に効きます。



\* 全6種 当社アレルギー用点眼剤シリーズ内



### 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと事故が起こりやすくなります)

- 点鼻薬と併用する場合には、乗物又は機械類の運転操作をしないでください** (眠気等があらわれることがあります)

#### 相談すること



##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (4)減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (5)次の症状のある人。  
    はげしい目の痛み  
(6)次の診断を受けた人。  
    緑内障  
(7)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。  
    特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、  
    使用前に医師に相談してください。
  - ・片方の目だけに症状がある場合
  - ・目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
  - ・視力にも影響がある場合

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

##### 3. 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2日間使用しても症状がよくならない場合。

##### 4. 症状の改善がみられても、2週間を超えて使用する場合は、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 〔効能・効果〕

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）

## 〔用法・用量〕

1回1～2滴、1日4回点眼してください。

2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### （用法・用量に関する注意）

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください（一旦コンタクトレンズを外してから点眼してください）。
- 点眼用にのみ使用してください。
- 定められた用法・用量を守ってください。
- 液色は、成分の色です。点眼時、衣服等につかないように注意してください。もし、衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。

## 〔成 分〕

成 分	分 量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1.0%	アレルギーの原因となる化学伝達物質の放出を抑制します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン作用により、アレルギー症状の目のかゆみ・充血を緩和します。
アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物（水溶性アズレン）	0.02%	ハーブ生薬（カミツレ）由来の消炎成分で、充血やかゆみ等の炎症を効果的にしづめます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	局所の炎症をしづめ、目のかゆみを抑えます。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	0.5%	膜の透明性を維持し、角膜表層を保護します。
ピリドキシン塩酸塩	0.1%	目の粘膜の維持にはたらきます。

添加物：エデト酸ナトリウム水和物、チオ硫酸ナトリウム水和物、ホウ砂、l-メントール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、エタノール、等張化剤、ホウ酸、pH調節剤を含有

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとて使用してください。
- (7) 成分の水溶性アズレンは光線によって変化しやすい性質を有していますので、使用後は遮光袋に入れて保存してください。
- (8) 品質保持のため脱酸素剤が入っています。点眼薬をビニール袋から取り出した際には脱酸素剤を捨ててください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <https://www.zeria.co.jp/>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html) 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

ピューカリアはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



Self-Medication

製造販売元  
**ゼリア新薬工業株式会社**  
東京都中央区日本橋小舟町10-11

