

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

しっしん・かぶれ・かゆみ  
**オイラックス<sup>®</sup>ソフト**  
鎮痒消炎薬

オイラックスソフトの特徴

- 伸びがよく、白残りしにくいクリームです。
- ステロイド成分を配合していません。
- クロタミトンとジフェンヒドラミン塩酸塩が、虫さされ等のかゆみにすぐれた効果を発揮します。
- グリチルレチン酸が、患部の炎症を緩和します。
- 皮膚の組織修復を助けるアラントインを配合しています。
- イソプロピルメチルフェノールが、殺菌作用を発揮します。



使用上の注意



相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

しっしん、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん、しもやけ、皮膚炎、あせも、ただれ

## 使 用 法


1日1～3回、適量を患部に塗布して下さい。

〈使用法に関する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 粘膜には使用しないで下さい。
- (5) 外用にのみ使用して下さい。

### チューブの開け方

キャップを逆向きにし、中にある突起部をチューブの口に深く差込み、穴を開けて下さい。



## 成 分・分 量

本剤は、白色のクリームで、100g中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
クロタミトン	10.0 g	かゆみをおさえます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0 g	
グリチルレチン酸	0.5 g	皮膚の炎症をしづめます。
アラントイン	0.2 g	皮膚の組織修復を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1 g	殺菌作用を発揮します。
トコフェロール酢酸エステル	0.5 g	血流を改善し、症状の回復を助けます。

添加物:ワセリン、ステアリルアルコール、ジメチルポリシロキサン、グリセリン、ステアリン酸マクロゴール、香料

〈成分・分量に関する注意〉

塗布後ほてり(熱感)を感じることがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山市横越168