

鎮静薬

リスロンS[®]



リスロンSは、不安・緊張の鎮静を目的とした薬です。

不安を感じたり、緊張したりすることは、日常の出来事に関連して起こりやすく、ストレス、心配事、悩み事など、心理的なことが大きな要因になります。このような、心理的な働きは、大脳皮質によっておこなわれています。

リスロンSは、大脳皮質やそれを伝える役目である脳幹網様体（のうかんもうようたい）に働き、不安や緊張を鎮める成分、ブロムワレリル尿素を配合した、鎮静薬です。

リスロンSは、片面に SATO の刻印のある崩壊の早い白色の素錠です。

〔成分・分量〕 3錠中 _____

ブロムワレリル尿素…………… 300mg

〔効 能〕 _____

不安緊張状態の鎮静。

〔用法・用量〕 _____

大人1日3回、1回2～3錠を服用します。
服用間隔は4時間以上おいてください。

〔使用上の注意〕

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 今までに薬によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
- (3) 高齢者又は虚弱者。
- (4) 肝障害、腎障害のある人。
- (5) 医師の治療を受けている人。

2. 服用に際して、次のことに注意してください

- (1) 本剤は、劇薬に該当する成分が含まれていますので、定められた用法、用量を厳守してください。
- (2) 次の薬剤とは同時に服用しないでください。

★裏面につづく

他の鎮静薬、催眠鎮静薬、解熱鎮痛薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤等

(3) 小児には、服用させないでください。

3. 服用中又は服用後は、次のことに注意してください

(1) 本剤の服用により、発疹・発赤、悪心・嘔吐、食欲不振、下痢等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

(2) 本剤の服用により、ねむけをもよおすことがありますので、自動車又は機械類の運転操作をしないでください。

(3) 数回服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

(4) 長期連用しないでください。

4. 保管及び取扱い上の注意

(1) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。



製造発売元 **佐藤製薬株式会社**

東京都品川区東大井6丁目8番5号