

クスリ早見帖2015年版

新製品データ 2015年9月17日更新

要指導医薬品 枠色：紫
第1類医薬品 枠色：橙
指定第2類医薬品 枠色：青
第2類医薬品 枠色：緑

[お問合せ先]
株式会社プラメドプラス
E-mail: info@plamedplus.co.jp

クスリ早見帖2015年版をお持ちの方へ

きれいに印刷して、
ピッタリサイズの「MEMO欄」等に
に切り貼りして、ご利用ください。
新製品の医薬品成分特定に役立ちます！

解熱鎮痛薬 エキセドリンLOX

用法 15歳以上1回1錠、1日2回まで、ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上。

成分 1錠中 [15歳以上の1回量に相当]
ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg)



ライオン株式会社

解熱鎮痛薬 コルゲンコーワ 鎮痛解熱LXα

用法 15歳以上1回1錠、1日2回まで、ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。なるべく空腹時をさけて水又は温湯で服用。服用間隔は4時間以上。

成分 1錠中 [15歳以上の1回量に相当]
ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg)
トラネキサム酸 140mg



興和株式会社

解熱鎮痛薬 ノーシンAI頭痛薬

用法 15歳以上1回2錠、1日3回を限度になるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上。

成分 2錠中 [15歳以上の1回量に相当]
イブプロフェン 150mg
アセトアミノフェン 65mg



株式会社アラクス

解熱鎮痛薬 リングル®アイビー錠α200

用法 15歳以上1回1錠、1日2回まで、ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上。

成分 1錠中 [15歳以上の1回量に相当]
イブプロフェン 200mg



佐藤製薬株式会社

総合感冒薬 ルルアタック®NX

用法 15歳以上1回2錠を、1日3回食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用。

成分 2錠中 [15歳以上の1回量に相当]
イブプロフェン 150mg
ペラドンナ総アルカロイド 0.1mg
クレマスチンフマル酸塩 0.45mg
プロムヘキシシン塩酸塩 4mg
ジヒドロコデインリン酸塩 8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg
無水カフェイン 25mg
ベンフォチアミン (ビタミンB₁誘導体) 8.3mg
リボフラビン (ビタミンB₂) 4mg



第一三共ヘルスケア株式会社

総合感冒薬 新ルル®Aゴールドs

用法 15歳以上1回3錠、11歳以上15歳未満1回2錠、7歳以上11歳未満1回1錠を、1日3回食後なるべく30分以内に水又はお湯で服用。

成分 3錠中 [15歳以上の1回量に相当]
クレマスチンフマル酸塩 0.45mg
ペラドンナ総アルカロイド 0.1mg
プロムヘキシシン塩酸塩 4mg
アセトアミノフェン 300mg
ジヒドロコデインリン酸塩 8mg
ノスカピン 16mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg
無水カフェイン 25mg
ベンフォチアミン (ビタミンB₁誘導体) 8mg



第一三共ヘルスケア株式会社

解熱鎮痛薬 ロキソニン®Sプラス

用法 15歳以上1回1錠、1日2回まで、ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。なるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上。

成分 1錠中 [15歳以上の1回量に相当]
ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg)
酸化マグネシウム 33.3mg



第一三共ヘルスケア株式会社

クスリ早見帖2015年版

パッケージ変更品データ 2015年9月17日更新

要指導医薬品	枠色：紫
第1類医薬品	枠色：橙
指定第2類医薬品	枠色：青
第2類医薬品	枠色：緑

[お問合せ先]
株式会社プラメドプラス
E-mail: info@plamedplus.co.jp

①
切り



②
貼り



解熱鎮痛薬 バファリンナ

用法 15歳以上1回2錠、1日3回を限度になるべく空腹時をさけて水又はぬるま湯で服用。服用間隔は4時間以上。

成分 2錠中 [15歳以上の1回量に相当]
イブプロフェン 130mg
アセトアミノフェン 130mg
無水カフェイン 80mg
乾燥水酸化アルミニウムゲル 70mg



ライオン株式会社

解熱鎮痛薬 ロキソニン[®]S

用法 15歳以上1回1錠、1日2回を限度になるべく空腹時をさけて水又はお湯で服用。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用できる。服用間隔は4時間以上。

成分 1錠中 [15歳以上の1回量に相当]
ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg (無水物として60mg)



第一三共ヘルスケア株式会社

クスリ早見帖2015年版

追加掲載品データ 2015年9月17日更新

要指導医薬品	枠色：紫
第1類医薬品	枠色：橙
指定第2類医薬品	枠色：青
第2類医薬品	枠色：緑

[お問合せ先]
株式会社プラメドプラス
E-mail: info@plamedplus.co.jp

生理痛専用薬 エルペイン コーワ

用法 15歳以上1回1錠、1日3回を限度になるべく空腹時をさせて水又は温湯で服用。
服用間隔は4時間以上。

成分 1錠中 [15歳以上の1回量に相当]
イブプロフェン 150mg
ブチルスコポラミン臭化物 10mg



興和株式会社