

貯法：室温保存  
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。  
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)3828
葉価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 N105

漢方製剤  
**コタロー通導散エキス細粒**

**〔組成・性状〕**

\*\***(1)組成**

本剤12.0g中
日局 トウキ……………3.0g
日局 ダイオウ……………3.0g
日局 無水ボウショウ……………1.8g
日局 キジツ……………3.0g
日局 コウボク……………2.0g
日局 チンピ……………2.0g
日局 モクツウ……………2.0g
日局 コウカ……………2.0g
日局 ソボク……………2.0g
日局 カンゾウ……………2.0g

上記の混合生薬より抽出した通導散の水製乾燥エキス6.5gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ブルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

**(2)製剤の性状**

本剤は茶褐色～褐色の細粒で、特異なにおいがあり、味は苦辛い。

識別コード：N105

**〔効能・効果〕**

比較的体力があり下腹部に圧痛があって便秘しがちなものの次の諸症：

月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打撲、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）。

**〔用法・用量〕**

通常、成人1日12.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

**〔使用上の注意〕**

**(1)慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）**

- 1) 下痢、軟便のある患者 [これらの症状が悪化するおそれがある。]
- 2) 著しく胃腸の虚弱な患者 [食欲不振、胃部不快感、恶心、腹痛、下痢等があらわれることがある。]
- 3) 食欲不振、恶心、嘔吐のある患者 [これらの症状が悪化するおそれがある。]
- 4) 著しく体力の衰えている患者 [副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。]

**(2)重要な基本的注意**

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- 3) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ダイオウを含む製剤との併用には、特に注意すること。
- 4) ダイオウの瀉下作用には個人差が認められるので、用法・用量に注意すること。

**(3)相互作用**

**併用注意（併用に注意すること）**

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
①カンゾウ含有製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。（「重大な副作用」の項参照）	グリチルリチン酸は尿細管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。
②グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤		

**(4)副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

**1)重大な副作用**

- ①偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- ②ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

**2)その他の副作用**

	頻度不明
*肝臓	肝機能異常 (AST (GOT)、ALT (GPT) の上昇等)
消化器	食欲不振、胃部不快感、恶心、腹痛、下痢等

**(5)高齢者への投与**

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

**(6)妊娠・産婦・授乳婦等への投与**

- \*\* 1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。 [本剤に含まれるダイオウ（子宮収縮作用及び骨盤内臓器の充血作用）、無水ボウショウ（子宮収縮作用）、コウカにより流早産の危険性がある。]
- 2) 授乳中の婦人には慎重に投与すること。 [本剤に含まれるダイオウ中のアントラキノン誘導体が母乳中に移行し、乳児の下痢を起こすことがある。]

**(7)小児等への投与**

小児等に対する安全性は確立していない。 [使用経験が少ない。]

**\*\* (8)その他の注意**

本剤には無水ボウショウが含まれているので、治療上食塩制限が必要な患者に継続投与する場合は注意すること。

**〔取扱い上の注意〕**

- (1) 漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当らない涼しい場所に保管してください。

特に、ポリ瓶の場合はキャップを堅く締めて保管してください。

- (2) 本剤は天然の生薬を原料としていますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

**〔包 製〕**

**コタローー通導散エキス細粒**

ポリ瓶 500g

分包 4.0g×147包 (588g)

4.0g×42包 (168g)

**〔資料請求先〕**

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部

〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140

(9:00~17:30／土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



**小太郎漢方製薬株式会社**

大阪市北区中津2丁目5番23号