

貯法：室温保存  
使用期限：容器・外箱に記載の使用期限内に使用してください。  
注意：取扱い上の注意の項参照

承認番号	(61AM)3833
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

商品番号 | N16

漢方製剤

# コタロー 半夏厚朴湯

エキス細粒

## 〔組成・性状〕

### (1) 組成

本剤6.0g中

日局 ハンゲ……………6.0g	日局 コウボク……………3.0g
日局 ブクリョウ…………5.0g	日局 ソヨウ……………2.0g
日局 ショウキョウ…………1.0g	

上記の混合生薬より抽出した半夏厚朴湯の水製乾燥エキス2.2gを含有する。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

### (2) 製剤の性状

本剤は褐色～灰褐色の細粒で、特異なおいがあり、味はやや苦い。

識別コード：N16

## 〔効能・効果〕

精神不安があり、咽喉から胸元にかけてふさがるような感じがして、胃部に停滞膨満感のあるもの。通常消化機能悪く、悪心や嘔吐を伴うこともあるもの。

気管支炎、嘔声、咳嗽発作、気管支喘息、神経性食道狭窄、胃弱、心臓喘息、神経症、神経衰弱、恐怖症、不眠症、つわり、その他嘔吐症、更年期神経症、浮腫、神経性頭痛。

## 〔用法・用量〕

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

## 〔使用上の注意〕

### (1) 重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

### (2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
* 過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、痒痒等
** 肝臓	肝機能異常(AST、ALT等の上昇)

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

### (3) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

### (4) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上まわると判断される場合にのみ投与すること。

### (5) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少くない。〕

## 〔取扱い上の注意〕

- (1) 漢方製剤は吸湿しやすいので、湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。  
特に、ポリ瓶の場合はキャップを強く締めて保管してください。
- (2) 本剤は天然の生薬を原料としておりますので、ロットにより色調等に異同がありますが、効能その他に変わりはありません。

## 〔包装〕

### コタロー半夏厚朴湯エキス細粒

ポリ瓶	500g
分包	2.0g×231包(462g)
	2.0g×42包(84g)

## 〔資料請求先〕

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部  
〒531-0071

大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06-6371-9106 FAX 06-6377-4140

(9:00～17:30/土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社

大阪市北区中津2丁目5番23号