

\* \* 2018年10月改訂 (第3版)  
\* 2008年8月改訂

漢方製剤

三和 苓桂朮甘湯 エキス細粒

日本標準商品分類番号	875200
承認番号	(61AM)3621
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

**貯法・取扱い上の注意**

吸湿しやすいので、使用後は密栓し、直射日光を避け涼しいところに保管すること。

**使用期限**

ラベル又は外箱に表示。

苓桂朮甘湯

S-16

本品は傷寒論・金匱要略に記載されている「苓桂朮甘湯」の水製エキスを細粒剤にした服用しやすい製剤である。

**【組成】**

本品1日量(4.5g)中、下記の日局苓桂朮甘湯エキス1.7gを含有する。

日局	ブクリョウ	6.0g	日局	ビャクジュツ	3.0g
日局	ケイヒ	4.0g	日局	カンゾウ	2.0g

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸を含有する。

**【性状】**

本品はかっ色の細粒で、特異な芳香を有し、味は苦く、甘い。

\* \* 識別コード：S-16

**【効能又は効果】**

頭痛、頭重、のぼせ、めまい、立ちくらみ、動悸、心悸亢進などがあって不眠、精神不安などを伴い尿量減少の傾向があるものの次の諸症

神経性心悸亢進症、心臓弁膜症、血圧異常、起立性めまい、メニエル氏症候群、神経衰弱、腎臓疾患

**【用法及び用量】**

通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

**【使用上の注意】**

**1. 重要な基本的注意**

- (1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- (2) 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- (3) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

**2. 相互作用**

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(1) カンゾウ含有製剤 (2) グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。「重大な副作用」の項参照)	グリチルリチン酸は尿管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

**3. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

**(1) 重大な副作用**

- 1) 偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 2) ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

**\*(2) その他の副作用**

	頻度不明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹、発赤、痒痒等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

**4. 高齢者への投与**

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量する等注意すること。

**5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与**

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

**6. 小児等への投与**

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

**【包装】** 500g、1.5g×300包



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6番地1