

FC87

ジュンコウ
六味地黄丸料

貯 法：室温保存
「取扱い上の注意」
の項参照
使用期限：外箱に表示

FCエキス細粒 医療用

ろく み じ おう がん
(六味地黄丸)

**承認番号	16100AMY00373000
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

【組成・性状】

** (1)本剤は1日量6.0g中、下記生薬より抽出した水製乾燥エキス(六味地黄丸料エキス)3.65gを含有する。

[日局 ジオウ 5g 日局 タクシヤ 3g]
[日局 サンシュユ 3g 日局 ブクリヨウ 3g]
[日局 サンヤク 3g 日局 ボタンピ 3g]

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物を含有する。

(2)本剤は褐色の細粒で、特異なにおいがあり、味はわずかに辛い。

識別コード：FC 87

【効能又は効果】

疲れやすくて尿量減少または多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ

【用法及び用量】

通常、成人1日6.0gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

(1) 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 1) 著しく胃腸の虚弱な患者[食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐、下痢等があらわれるおそれがある。]
- 2) 食欲不振、恶心、嘔吐のある患者[これらの症状が悪化するおそれがある。]

(2) 重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

(3) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
消化器	食欲不振、胃部不快感、恶心、嘔吐、下痢等

(4) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(5) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、投与しないことが望ましい。[本剤に含まれるボタンピにより流早産の危険性がある。]

(6) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

【取扱い上の注意】

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがあります、効果に変わりありません。

【包 裝】

168g (2.0g × 84包)

【文献請求先】(お問い合わせ先)

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
TEL 050-3776-0358

* 製造販売元

康和薬通有限会社

大阪府柏原市円明町1000-37

発売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2