

漢方製剤

オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG

さいこ かりゅうこつ ぼれいとう
(柴胡加竜骨牡蛎湯)

承認番号	(61AM) 第4820号
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

貯法：室温保存
「取扱い上の注意」
の項参照
使用期限：容器又は外箱に表示

【組成・性状】

(1)本剤は1日量7.5g中、下記生薬より抽出した水製乾燥エキス(柴胡加竜骨牡蛎湯エキス)3.4gを含有する。

日局 サイコ	5g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ハンゲ	4g	日局 ニンジン	2.5g
日局 ブクリョウ	3g	日局 リュウコツ	2.5g
日局 ケイヒ	3g	日局 ボレイ	2.5g
日局 オウゴン	2.5g	日局 ダイオウ	1g
日局 タイソウ	2.5g		

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

(2)本剤は淡灰黄褐色～淡灰茶褐色の顆粒で、特異なおいがあり、味は辛く、やや苦い。

識別コード：SG-12

【効能又は効果】

精神不安があつて、どうき、不眠などを伴う次の諸症：高血圧の随伴症状（どうき、不安、不眠）、神経症、更年期障害、小児夜なき

【用法及び用量】

通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

(1)慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- 1)下痢、軟便のある患者〔これらの症状が悪化するおそれがある。〕
- 2)著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢等があらわれることがある。〕
- 3)著しく体力の衰えている患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕

(2)重要な基本的注意

- 1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ダイオウを含む製剤との併用には、特に注意すること。
- 3)ダイオウの瀉下作用には個人差が認められるので、用法・用量に注意すること。

(3)副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

1)重大な副作用

間質性肺炎：発熱、咳嗽、呼吸困難、肺音の異常（捻髪音）等があらわれた場合には、本剤の投与を中止し、速やかに胸部X線等の検査を実施するとともに副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。また、発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれた場合には、本剤の服用を中止し、ただちに連絡するよう患者に対し注意を行うこと。
肝機能障害、黄疸：AST（GOT）、ALT（GPT）、ALP、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2)その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、痒痒、蕁麻疹等
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛、下痢等

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(4)高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(5)妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- 1)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。〔本剤に含まれるダイオウの子宮収縮作用及び骨盤内臓器の充血作用により流産の危険性がある。〕
- 2)授乳中の婦人には慎重に投与すること。〔本剤に含まれるダイオウ中のアントラキノン誘導体が母乳中に移行し、乳児の下痢を起こすことがある。〕

(6)小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない〕

【取扱い上の注意】

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがありますが、効果に変わりありません。

【包装】

500g	
735g	(2.5g × 294包)
210g	(2.5g × 84包)

【文献請求先】（お問い合わせ先）

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
TEL 050-3776-0358