

※※2014年4月改訂（第3版）

※2010年7月改訂

貯 法：直射日光をさけ、吸湿注意。

開封後は密閉保存。

使用期間：3年（使用期限は外箱・ラベルに表示）

| | |
|------------|--------------------|
| 日本標準商品分類番号 | 875200 |
| 承認番号 | 21900AMX00636000 |
| 薬価収載 | 2007.7 |
| 販売開始 | 2007.7 |
| ※※ 再評価結果 | *1986.10 2014.4 |

* 旧販売名による

漢方製剤 クラシエ 桂枝加芍薬湯 エキス錠 (ケイシカ シャクヤクトウ) EKT-60

〔組成・性状〕

1. 組成

本薬 1日量（18錠）中

日局ケイヒ 4.0g

日局シャクヤク 6.0g

日局タイソウ 4.0g

日局ショウキョウ 1.0g

日局カンゾウ 2.0g

上記の混合生薬より抽出した桂枝加芍薬湯エキス粉末3,200mgを含有する。

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局タルク、日局カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日局結晶セルロース、水酸化アルミナマグネシウムを含有する。

2. 製剤の性状

本薬は、ほとんどにおいはないか、わずかに特異なにおいがあり、味はわずかに甘く、後に苦い。

| 剤 形 (色・形状) | 外 形 | | | 大きさ |
|---------------------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| 淡かっ色 ～かっ色 素 錠 | 表 ○ | 裏 ○ | 側面 ○ | 直径 9.2mm 厚さ 4.6mm 重量 330mg |

〔効能・効果〕

腹部膨満感のある次の諸症：

しぶり腹、腹痛

〔用法・用量〕

通常、成人1日18錠を2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体质・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

(2)本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場

合には投与を中止すること。

(3)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

2. 相互作用

併用注意（併用に注意すること）

| 薬剤名等 | 臨床症状・措置方法 | 機序・危険因子 |
|----------------------------------|--|--|
| (1)カンゾウ含有製剤 | 偽アルドステロン症 | グリチルリチン酸は |
| (2)グリチルリチン酸 及びその塩類を 含有する製剤 | があらわれやすくな る。また、低カリウ ム血症の結果とし て、ミオパチーがあ らわれやすくなる。 (「重大な副作用」の 項参照) | 尿細管でのカリウ ム排泄促進作用が あるため、血清カリ ウム値の低下が 促進されることが 考えられる。 |

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

(1)重大な副作用

1) **偽アルドステロン症**：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察（血清カリウム値の測定等）を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

2) **ミオパチー**：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

(2)その他の副作用

| | 頻 度 不 明 |
|-----------------------|-----------|
| 過 敏 症 ^(注1) | 発疹、発赤、瘙痒等 |

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

[包装]

クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠

252錠（3錠×6連包×14シート）

1,764錠（3錠×6連包×98シート）

※[文献請求先]

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

※[製品情報お問合せ先]

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374

〈受付時間〉10:00~17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574番地(郵便番号635-0051)