

※2010年7月改訂（第2版）
2007年7月作成

貯 法：直射日光をさけ、吸湿注意。
開封後は密閉保存。

使用期間：3年（使用期限は外箱・ラベルに表示）

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	21900AMX00644000
薬価収載	2007.7
販売開始	2007.7 *1987.12

*旧販売名による

漢方製剤

クラシエ 四物湯 エキス錠

(シ モツ トウ)

EKT-71

〔組成・性状〕

1. 組成

本薬1日量（18錠）中

日局トウキ ……………3.0g

日局シャクヤク ……………3.0g

日局センキュウ ……………3.0g

日局ジオウ ……………3.0g

上記の混合生薬より抽出した四物湯エキス粉末
3,300mgを含有する。

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局
カルメロースカルシウム、日局軽質無水ケイ酸、日
局乳糖水和物、日局結晶セルロース、水酸化アルミ
ナマグネシウムを含有する。

2. 製剤の性状

本薬は、わずかに特異なおいがあり、味はわずかに
甘く、後に苦い。

剤形 (色・形状)	外形			大きさ
淡かつ色 ～かつ色 素錠	表	裏	側面	直径 9.2mm 厚さ 4.9mm 重量 330mg
	○	○	≡	

〔効能・効果〕

皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の
次の諸症：

産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、し
もやけ、しみ、血の道症

〔用法・用量〕

通常、成人1日18錠を2～3回に分割し、食前又は食間
に経口投与する。

なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1)著しく胃腸の虚弱な患者〔食欲不振、胃部不快感、
悪心、嘔吐、下痢等があらわれることがある。〕
- (2)食欲不振、悪心、嘔吐のある患者〔これらの症状が
悪化するおそれがある。〕

2. 重要な基本的注意

- (1)本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を
考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、
症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与

を避けること。

- (2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複
に注意すること。

3. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる
調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

頻度不明	
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、 下痢等

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量
するなど注意すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療
上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ
投与すること。

6. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験
が少ない〕

〔包装〕

クラシエ四物湯エキス錠

252錠（3錠×6連包×14シート）

1,764錠（3錠×6連包×98シート）

※〔文献請求先〕

クラシエ薬品株式会社 医薬学術部

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3352 FAX 03(5446)3371

※〔製品情報お問合せ先〕

クラシエ薬品株式会社 お客様相談センター

〒108-8080 東京都港区海岸3-20-20

TEL 03(5446)3334 FAX 03(5446)3374

〈受付時間〉10:00～17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20(郵便番号 108-8080)

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**
奈良県大和高田市根成柿574番地(郵便番号635-0051)