

項目	内容
医薬品区分	一般用医薬品
薬効分類	かぜ薬（内用）
承認販売名	新カンボーエース
製品名	新カンボーエース
製品名（読み）	シンカンボーエース
製品の特徴	新カンボーエースは、鎮咳成分のジヒドロコデインリン酸塩や解熱鎮痛成分のアセトアミノフェンのほかビタミンC等を配合し、かぜの11の諸症状を緩和します。
使用上の注意	<p><b>■してはいけないこと</b>  <b>【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください  (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。  (3) 12歳未満の小児。</li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）</li> <li>服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  （眠気等があらわれることがあります。）</li> <li>授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</li> <li>服用前後は飲酒しないでください</li> <li>長期連用しないでください</li> </ol> <p><b>■相談すること</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  (3) 高齢者。  (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  (5) 次の症状のある人。  高熱、排尿困難  (6) 次の診断を受けた人。  甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症</li> <li>服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</li> </ol> <p>〔関係部位：症状〕  皮膚：発疹・発赤、かゆみ  消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振  精神神経系：めまい  泌尿器：排尿困難  その他：過度の体温低下</p> <p>まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。</p> <p>〔症状の名称：症状〕  ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。  皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。  薬剤性過敏症症候群：皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。※  肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。  腎障害：発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。  間質性肺炎：階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せ</p>

	<p>き、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。  ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。  呼吸抑制：息切れ、息苦しさ等があらわれる。</p> <p>3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  便秘、口のかわき、眠気</p> <p>4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>																						
<b>効能・効果</b>	かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和																						
<b>効能関連注意</b>																							
<b>用法・用量</b>	<p>次の量を、食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。</p> <p>[年齢：1回量：1日服用回数]  成人（15歳以上）：1包：3回  12歳以上15歳未満：2/3包：3回  12歳未満：服用しないでください</p>																						
<b>用法関連注意</b>	<p>(1) 用法・用量を厳守してください。  (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>																						
<b>成分分量</b>	<p>1日量（3包3.0g）中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>900mg</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24mg</td> </tr> <tr> <td>dl-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60mg</td> </tr> <tr> <td>マレイン酸カルビノキサミン</td> <td>7.5mg</td> </tr> <tr> <td>グアヤコールスルホン酸カリウム</td> <td>240mg</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75mg</td> </tr> <tr> <td>ヘスペリジン</td> <td>60mg</td> </tr> <tr> <td>アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）</td> <td>200mg</td> </tr> <tr> <td>チアミン硝酸塩（ビタミンB<sub>1</sub>）</td> <td>24mg</td> </tr> <tr> <td>リボフラビン（ビタミンB<sub>2</sub>）</td> <td>12mg</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	アセトアミノフェン	900mg	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	マレイン酸カルビノキサミン	7.5mg	グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	無水カフェイン	75mg	ヘスペリジン	60mg	アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）	200mg	チアミン硝酸塩（ビタミンB <sub>1</sub> ）	24mg	リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	12mg
成分	分量																						
アセトアミノフェン	900mg																						
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg																						
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg																						
マレイン酸カルビノキサミン	7.5mg																						
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg																						
無水カフェイン	75mg																						
ヘスペリジン	60mg																						
アスコルビン酸カルシウム（ビタミンC）	200mg																						
チアミン硝酸塩（ビタミンB <sub>1</sub> ）	24mg																						
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	12mg																						
<b>添加物</b>	部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース																						
<b>保管及び取扱い上の注意</b>	<p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。  (3) 他の容器に入れ替えないでください。  （誤用の原因になったり品質が変わります。）  (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。  (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。</p>																						
<b>消費者相談窓口</b>	<p>会社名：株式会社廣貴堂  問い合わせ先：お客様相談窓口  電話番号：076-424-2259  受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）</p>																						
<b>製造販売会社</b>	<p>（株）廣貴堂 <a href="#">添付文書情報</a>  会社名：株式会社廣貴堂  住所：富山市梅沢町2丁目9-1</p>																						
<b>販売会社</b>																							
<b>剤形</b>	散剤																						
<b>リスク区分等</b>	第「2」類医薬品																						