

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 第②類医薬品

かぜ薬  
小児用

# バコデS

☆小児用ノバコデSは、解熱・鎮痛剤を中心に「かぜ」の諸症状に効果をあらわす各成分を総合的に配合したのみやすいかぜ薬です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 過量服用・長期連用しないでください



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 授乳中の人  
(4) 高齢者  
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(6) 次の症状のある人 —— 高熱、排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人 —— 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

裏面もお読み下さい。■

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## ■適 応 症

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## ■用法・用量

1日3回食後及び必要な場合には就寝前に服用してください。

また、場合によっては、1日4回まで服用しても差し支えありませんが、1日4回服用する場合には原則として約6時間の間隔をおいて服用してください。添付の計量カップで量をはかり、服用してください。

年 齢	3才以上 7才未満	1才以上 3才未満	3ヵ月以上 1才未満	3ヵ月未満
1回量	4mL	3mL	2mL	服用しないこと

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- (4) 計量カップは使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。

## ■成 分

成 分	16mL 中	作 用
アセトアミノフェン	200mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
デキストロメトルファン 臭化水素酸塩水和物	10mg	せきの中枢にはたらき、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩 酸塩	12.5mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
無水カフェイン	18mg	頭痛をしずめます。
クロルフェニラミンマレ イン酸塩	1.65mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状をおさえます。
カンゾウエキス (原生薬換算量 320mg)	80mg	炎症をおさえ、のどの痛みをやわらげます。
グアヤコール スルホン酸カリウム	50mg	からんだたんをうすめて出しやすくします。

添加物としてカラメル、安息香酸 Na、D-ソルビトール、白糖、パラベン、アルコール、バニリン、香料を含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 服用のつどびんの口の周囲をよく拭いてから、キャップをしめてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

## ■お問い合わせ先

本品についてのお問合せは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

森田薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：(084) 943-8171

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



森田薬品工業株式会社

広島県福山市大門町野々浜 1059 番地

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

A810A1H