

乗物酔いによる
めまい・はきけに

大事な出張・楽しい旅行に
新アーター内服液

第2類医薬品

5本入

製造番号

使用期限

大事な出張・楽しい旅行に

乗物酔いによる
めまい・はきけに

乗る前に
1本

AIRPLANE



BUS



SHIP



NEW ARTAR LIQUID

新アーター内服液

第2類医薬品

【内服液タイプ】

20mL×5本入

乗る前に
1本

乗る前に
1本

5本入

5本入

乗る前に
1本乗物酔いによる
めまい・はきけに

販売名 新アーター内服液

第2類医薬品 20mL×5本入

押して開ける

副作用救済制度
☎0120-149-931

紙：箱

金属：キャップ
ガラス：ビン

△使用上の注意

× **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

● **相談すること**

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人：排尿困難(6)次の診断を受けた人：緑内障、心臓病

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

【成分・分量】1日量(2本・40mL)中

スコポラミン臭化水素酸塩水和物……………0.48mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………8mg
無水カフェイン……………100mg
※添加物として白糖、クエン酸水和物、安息香酸ナトリウム、香料を含有します。

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(20mL)を服用してください。乗物酔いの予防には乗車前30分前に1回1本を服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1本を4時間以上の間隔をおき服用してください。1日の服用回数は2回を限度とします。

●用法・用量を厳守してください。

●小児には服用させないでください。

保管及び取扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2.小児の手の届かない所に保管してください。3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4.使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎0120-468-771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元

協和薬品工業株式会社

版卓県版卓市野一色二丁目8番6号

製造販売元

合名会社 東宝製薬

版卓県版卓市沖ノ橋町3丁目45番地

