

胃の痛み
二日酔のむかつきに
イセア[®]
胃腸内服液

【成分・分量】 1瓶(30mL)中
スクラルファート水和物 500mg/メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 500mg/合成ヒドロタルサイト 250mg/コウボク流エキス 0.2mL(196mg)(厚朴200mgに相当)/ソウジュツ流エキス 0.2mL(196mg)(蒼朮200mgに相当)

添加物として、ヒドロキシプロピルデンプン、白糖、バラベン、アルコール、香料(*l*-メントールを含む)を含有します。

【用法・用量】
大人(15才以上)1回1瓶(30mL)、1日3回食前又は食間に服用します。

〈用法・用量に
関連する注意〉

☆服用前に瓶をよく振ってください。
定められた用法用量を厳守してください。

【使用上の注意】 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。2.長期連用しないでください **【相談すること】**

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人。(2)次の診断を受けた人。腎臓病 2.服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください 便秘、下痢 3.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効能】 胃痛、胃部膨満感、胃部不快感、胃重、胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃酸過多

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)(4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
電話 03-5412-7393



★本品には添付文書はついておりません。ラベルの記載文を代用しています。