

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

解熱鎮痛薬

第2類医薬品

新パトシツ錠[®]

新パトシツ錠は熱・痛みに効果のあるアセトアミノフェンとエテンザミドを配合し、更に鎮痛作用のあるシャクヤクとカンゾウを加えた非ピリン系の解熱鎮痛薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満) (6)次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の量をなるべく空腹時をさけて、水又はお湯と一緒に服用してください
4時間以上の間隔をあけて服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	3回まで
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- (3)錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量

成人1日量（6錠）中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
アセトアミノフェン	450mg	熱を下げ、痛みをやわらげます
エテンザミド	750mg	
カンゾウ粗エキス	180mg (原生薬として900mg)	咽喉痛をやわらげます。また、消炎作用があり、解毒作用があります
シャクヤク乾燥エキス	129mg (原生薬として900mg)	鎮痙・鎮痛作用があり、月経痛等をやわらげます
チアミンジスルフィド (ビタミンB誘導体)	18mg	神経痛・筋肉痛・関節痛をやわらげます

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタンを含有しています

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）

発売元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**
京都府向日市上植野町南開35-3