

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**第2類医薬品**  
解熱鎮痛薬

## 腰痛、神経痛、肩こり痛に セメジン顆粒

(シャクヤク・カンゾウエキス配合)

腰痛、神経痛、肩こり痛の痛みは、自分一人が苦しい思いをし、他人にはわかってもらえない苦しい症状です。その原因は筋肉の疲労、冷え、血圧異常、骨格の異常などさまざまです。その原因を追求し、根絶することが望ましいのですが同時に耐えられない「痛み」の症状をとり除くことが大切です。  
セメジン顆粒は腰痛、神経痛、肩こり痛等にすぐれた効果を発揮します。いわゆる貼る薬のような匂い、かぶれ、目立つといった心配のない内服療法薬です。

### △使用上の注意

#### ⊗してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人には服用しないでください
    - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
    - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
    - 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
  3. 服用前後は飲酒しないでください
  4. 長期服用しないでください

#### ■相関すること

1. 次の人には服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。
    - むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。
    - 高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんじん、汗のすけ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (ステイvens-Johnson症候群)、 中毒性表皮剥離症候群、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚の下に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、気促がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、両脚痛(膝や骨が痛む)、下痢等があらわれる

裏面も必ずお読みください

症状の名称	症状
胃腸性肺炎	胸骨を叩いたり、少し無理したりすると息切れがする・息苦しくなる、空咳、発熱等があらわれ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、 ミネラルコルチコイド不足	手足のだるさ、しびれ、つばの飲みこむのがつらくなって、視力低下、筋肉痛があらわれ、徐々に重くなる
ぜんそく	息をすすときせーせー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 【効能・効果】

- 頭痛・歯痛・拔牙後の疼痛・咽喉痛(のどの痛み)・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・おんざりともなう痛み(おんざり痛)・月経痛(生月痛)・外傷痛の鎮痛
- 熱寒(発熱によるむくみ)・発熱時の解熱

#### 【用法・用量】

次の1回量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。

年齢	1回量	1日服用限度	服用間隔
成人(15歳以上)	1包	2回	6時間以上
11歳以上15歳未満	2/3包		
7歳以上11歳未満	2/3包		
3歳以上7歳未満	1/3包		
3歳未満の乳幼児	服用しないでください。		

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用する場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分と作用】

1日量【2包(2.2g)】中に次の成分を含有しています。

成分	分量	作用
地倉乾熱エキス (原生薬熱算量)	250mg (200mg)	体温調節中枢を鎮静させ、体表面の血行をよくし、解熱効果をもたらします。
シャクヤクエキス (原生薬熱算量)	200mg (200mg)	抗炎症作用や鎮い作用により、筋肉のはしれい痛みに効果があります。
カンゾウ乾燥エキス (原生薬熱算量)	400mg (200mg)	
アセトアミノフェン	600mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、中枢性の解熱・鎮痛効果をあらわします。

追加物として、乳糖水和物、トウモロコシ澱粉、軽質無水ケイ酸、ケイ油、ウイキョウ油を含有します。  
〈成分に関連する注意〉

本剤は生薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限(外箱及び袋に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 1包を分割して、服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は

下記にお問い合わせください。

販売先：天野商事株式会社 お客様相談室 製造販売元：日新薬品工業株式会社 お客様相談室  
名古屋市中区大の三丁11番12号 滋賀県甲府市甲府町野崎80-1  
電話：(052)951-2340 電話：(0748)88-4156  
受付時間：9:00～17:00(土、日、夜目を除く) 受付時間：9:00～17:00(土、日、夜目を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931