

# 宇津救命丸「糖衣」

宇津救命丸「糖衣」は従来の宇津救命丸を乳幼児がより服用しやすいように、甘い糖衣で包みました。配合生薬のすぐれた作用により、夜泣き、かんむし、下痢、胃腸虚弱におだやかな効きめを現します。

## 特 長

- 1 乳幼児がより服用しやすいように、甘い糖衣でコーティングしました。
- 2 貴重な動物性生薬(ゴオウ、レイヨウカク、ギュウタン)と植物性生薬(ニンジン、オウレン、カンゾウ、チョウジ)を配合しました。
- 3 配合生薬のすぐれた作用により、乳幼児特有の「疳」といわれている精神的症状や肉体的症状におだやかな効きめを現します。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次のお子さまは服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質のお子さま。
- (2) 今までに薬によるアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ)やぜんそくを起こしたことがあるお子さま。
- (3) 次の症状のあるお子さま。  
はげしい下痢、高熱

#### 2. 次の場合は、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) ひきつけ、下痢、消化不良、乳はきに5～6回服用しても症状がよくなる場合。
- (2) 小児の疳、かんむし、夜泣き、食欲不振、胃腸虚弱に1ヶ月間服用しても症状がよくなる場合。

## 効 能

小児の疳、かんむし、夜泣き、ひきつけ、下痢、消化不良、食欲不振、胃腸虚弱、乳はき

## こんなときに

### かんむし



自分の思い通りにならないと、すぐじれて怒ったりキーン泣く。

### 夜泣き



昼間の外出などで興奮し、夜中に突然泣き出し、なかなか泣き止まない。

### 下痢・消化不良



かぜをひいたり、食べ物や飲み物が合わなかったりすると、すぐおなかをこわす。

### 食欲不振・胃腸虚弱



生まれつき胃腸の弱い赤ちゃんが消化不良や食欲不振をおこす。

(必ず裏面もお読みください)

# 宇津救命丸「糖衣」

## 成分・分量

1日量(30粒)中

成	分	分量
ゴオウ (牛 黄)	牛の胆嚢結石	5.0mg
レイヨウカク(羚羊角)	羚羊の頭角	15.0mg
ギウタン (牛 胆)	牛の胆汁末	6.0mg
ニンジン (人 参)	オタネニンジンの根	55.0mg
オウレン (黄 連)	黄連の根茎	30.0mg
カンゾウ (甘 草)	甘草の根茎	30.0mg
チョウジ (丁 子)	丁子の花蕾	4.5mg

添加物として、黄色4号(タートラジン)、黄色5号、香料、寒梅粉、白糖、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウを含有します。

## 用法・用量

いずれも1日3回、食前に服用してください。

年 齢	1 回 服 用 量	1 日 服 用 回 数
3ヶ月以上 1才未満	3 粒	3 回
1 才以上 3才未満	6 粒	
3 才以上 5才未満	8 粒	
5 才以上 8才未満	10 粒	
3ヶ月未満	服用させないこと	

乳児は授乳の際に乳頭につけ、母乳とともに与えるか、又は少量の砂糖・ジュースなどと服用されても結構です。

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法及び用量を厳守してください。
- (3) 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

問い合わせ先 宇津救命丸株式会社 お客様相談室

電話 03-3295-2681 受付時間/平日9:00~17:00

製造販売元 宇津救命丸株式会社高根沢工場 〒329-1224 栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢3987