



**第2類医薬品** **ノンシュガー**

**販売名:トラベルミン チュロップぶどう味**

**△ 使用上の注意**

**☒ [してはいけないこと]** 「守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる」

①本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳祛痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）  
②服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

**☒ [相談すること]** ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(5) 排尿困難のある人 (6) 緑内障、心臓病の診断を受けた人  
②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。【皮膚】発疹・発赤、かゆみ 【精神神経系】頭痛 【泌尿器】排尿困難【その他】顔のほてり、異常なまぶしさ まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。【再生不良性貧血】青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらうとする、血尿等があらわれる。【無顆粒球症】突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。  
③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

**■ 効能・効果**

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

**■ 用法・用量**

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	2錠	4時間以上の間隔をおいて
11才～14才	1錠	2回まで
5才～10才	1錠	
5才未満	×服用しないこと	

[用法・用量に関する注意] ①小児(5～14才)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。[ご注意] ②本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。③服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れないとください。

**■ 成分:1回量(11才以上)2錠中**

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 ..... 1.33mg  
スコボラミン臭化水素酸塩水和物 ..... 0.166mg  
添加物として、エタノール、クエン酸、プロピレンジコール、l-メントール、香料、アセスルファムK、イソマルチリゼリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNaを含有

**■ 保管及び取扱い上の注意**

①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。②小児の手の届かない所に保管してください。③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

MOTION SICKNESS REMEDY  
**Travelmin® Churup**  
**Grape Flavor**  
(For 5 or more years old)

4 987028 110651