

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

イブプロフェン配合総合かぜ薬 のどの痛み、発熱、せき、鼻水に **カイゲン感冒錠**

「カイゲン感冒錠」は、イブプロフェン、クレマスチンマル酸塩に4つの有効成分をバランス良く配合した総合かぜ薬です。イブプロフェンは痛みの原因物質（プロスタグランジン）の生成を抑制し、気道粘膜の炎症症状をおさえますので、かぜによるのどの痛みや頭痛・発熱を緩和します。また抗ヒスタミン薬であるクレマスチンマル酸塩はうつとうしいくしゃみ、鼻水、鼻づまりを緩和してくれる成分です。

かぜの症状はさまざままで、こじらせるといいろいろな病気の原因になることもありますので、早めの適切な手当と養生が大切です。



使用上の注意

ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)15歳未満の小児。
- (4)出産予定日12週以内の妊娠。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

- (眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 服用前後は飲酒しないでください
6. 5日間を超えて服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。

高熱、排尿困難

※(6)次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

(7)次の病気にかかったことのある人。

胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クロール病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹痛、下痢、血便
精神神経系	めまい、興奮、けいれん
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息切れ
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。)
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
※呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気

4.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(特に熱が3日以上続いたり、又熱が反復したりするとき)

【効能・効果】

かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

次の1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量
成人(15歳以上)	3錠
15歳未満	服用しないでください

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
(2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】 9錠(1日量)中

成 分	分 量	は た ら き
イブプロフェン	450mg	かぜによるのどの痛み、頭痛・発熱、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛みを緩和してくれます。
クレマスチンフル酸塩(クレマスチンとして)	1.34mg (1mg)	かぜによるアレルギー症状の、くしゃみ、鼻水、鼻づまりを緩和してくれます。
ジビドロコデインリン酸塩	22mg	せきの中枢に直接はたらいて、せきをしのぎてくれます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	収縮した気管を拡げ、呼吸をしやすくし、せきを抑えてくれます。
プロムヘキシン塩酸塩	12mg	たんの切れを良くし、また粘液の分泌量を増加して、たんを排出しやすくなってくれます。
無水カフェイン	75mg	脳の血管にはたらいて、頭をスッキリさせ、頭重(頭が重い感じ)をやわらげてくれます。

添加物として、セルロース、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(5)PTPを包装しているアルミピローに破れがあった場合は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話06-6202-8911
受付時間：9:00~17:00 (土曜、日曜、祝日を除く)

発売元

カイゲンファーマ株式会社
大阪市中央区道修町二丁目5番14号

製造販売元

武田テバファーマ株式会社
名古屋市中村区太閤一丁目24番11号