

鼻炎用点鼻薬 コルゲンコーカ 鼻炎ジェット

コルゲンコーカ鼻炎ジェットは、鼻づまり、鼻みず、くしゃみといったつらい鼻炎の症状にすぐれた効きめをあらわす点鼻薬です。

- 霧状になった有効成分が鼻の奥の奥部にまで直接とどくように設計されている定量噴霧スプレー容器です。
- シューと噴霧すると、4種類の成分が霧状の微粒子となって均一にひろがり、鼻粘膜の不快な症状を改善します。
- 清涼化剤/-メントールとペパーミント香料の同時配合により、スキッピング感になっていきます。

つらい鼻炎症状が続くと、物事に集中できなくなったり、仕事や日常生活にまで影響を及ぼしかねません。
ですから、いつでもどこでも、効きめのすぐれたコルゲンコーカ鼻炎ジェットで早めの手当てをすることが大切です。
シューと噴霧すると、つらい鼻炎の症状がおさまり、鼻が気持ちよく通ってまいります。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

① 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 長期連用しないでください



相談すること

① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③ 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量(1mL中)

成分・分量	働き
ナファザリン塩酸塩 0.5mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、ハレや充血を抑え、鼻づまりなどを緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩 5.0mg	鼻づまり、鼻みず、くしゃみなどの症状をやわらげます。
ベンザルコニウム塩化物 0.2mg	細菌による感染を防ぎ、鼻腔内を清潔にします。
リドカイン 3.0mg	鼻粘膜の痛み、かゆみを鎮めます。

[添加物] クエン酸、塩化Na、エタノール、/-メントール、香料

(裏面へ続く)

効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

用法・用量


下記の量を鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)及び7歳以上のお子様	1~2度ずつ	1~5回
7歳未満のお子様	× 使用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- ①用法・用量を厳守してください。
- ②過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- ③小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ④点鼻用にのみ使用してください。

〈容器の使い方〉



保管及び取扱い上の注意

- ①高温を避け、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④他の人と共用しないでください。
- ⑤使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566 受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



発売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造販売元 日東薬品工業株式会社 〒617-0006 京都府向日市上植野町南開35-3