

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとしめて立てて保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる)
- (4)火気には近づけないこと
- (5)本剤使用後の一定の時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性があるので、運転中の使用は控えること
- 使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること
- 携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること
- 使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること
- 液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

火気厳禁

第二石油類
危険等級Ⅲ

エタノール含有物
水溶性

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

口腔咽喉薬

販売名:ハレナースプレー 第3類医薬品

Medicine for Throat Pain and Swelling

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(箱底面及び容器ラベルに記載)
過ぎた製品は使用しないこと

⚠ 使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

■長期連用しないこと

■相談すること

1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3)次の症状のある人: 口内のひどいだれ

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気

3.使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること: 口の刺激感

4.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

あつらいいな／をカタチにする

発 売 元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3



効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください

〈用法・用量に関する注意〉

(1)のどの炎症の場合には、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること

(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること

(4)噴射塗布のみに使用すること

(5)薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

成分・分量

100mL中

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物………0.02g
セチルピリジニウム
塩化物水和物……………0.3g
添加物として、D-ソルビトール、ブロビレングリコール、グリセリン、リソ酸二水素Na、リソ酸水素Na、エタノール、メントールを含有する