

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限（パッケージ底面及びビンラベルに記載）を過ぎた製品は服用しないこと

水分代謝を上げて、  
更年期などのむくみ・  
脂肪を落とす



販売名：アクリアEX

漢方製剤 第2類医薬品

### 製品特徴

- 1日2回の服用で更年期などのむくみ・脂肪を落とします
- 低下した水分代謝を活性化し、溜まった水分を押し出します
- 特にむくみがちな方、体脂肪を減らしたい方に適した漢方薬です
- 6種類の生薬からなる防己黄耆湯<sup>ポウイオウキトウ</sup>を、服用しやすい錠剤にしました
- 効き目\*のサインは、尿量が増えることです ※むくみへの効果のこと

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - (5) 次の症状のある人  
むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：  
肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）、むくみ、肥満に伴う関節の腫れや痛み、多汗症

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	5錠	1日2回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
  - (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

## 成分・分量 1日量（10錠）中

防已黄耆湯エキス… 3.2g

ボウイ ……………5.0g	オウギ ……………5.0g
ビャクジュツ ………3.0g	ショウキョウ ………1.0g
タイソウ ……………3.0g	カンゾウ ……………1.5g
より抽出	

添加物として、二酸化ケイ素、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有する

●本剤は天然物（生薬）を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先（お客様相談室）  
**0120-5884-01**  
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 小林製薬株式会社  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3