

## 用法・用量

大人(15才以上)1回1本、  
1日3回食間によく振って  
から服用してください(15  
才未満は服用しないこと)

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守  
すること

●本剤は、本質的に沈でんを  
含んでいますので、服用前  
によく振ってから服用してく  
ださい

●食間とは「食事と食事の間」  
を意味し、食後約2～3時間の  
ことをいいます

## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない  
湿気の少ない涼しい所に  
保管すること

(2)小児の手の届かない  
所に保管すること

(3)他の容器に入れ替え  
ないこと(誤用の原因に  
なったり品質が変わる)

(4)キャップをあけたら飲  
みきることを

## 第2類医薬品 漢方製剤

販売名:新生小青竜湯内服液

ウイルスの季節に、のどや鼻の奥がイガイガしたら要注意!

のどがイガイガしたり、鼻の奥がツーンとヒリヒリすることはないですか?それはのどや鼻の粘膜のバリア機能が弱っているサインかもしれません。ウイルス感染の入り口となりやすいのどや鼻の粘膜は、感染の原因と戦うために本来のバリア機能を維持することが重要です。



服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限(箱天面及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

## ⚠ 使用上の注意

☑(相談すること) 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある  
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加え、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

3. 1ヶ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

Medicine for Cold and Rhinitis

## 特徴

- ウイルスが気になる季節に、のどと鼻の機能を正常化する液体タイプの漢方薬です
- 漢方処方「小青竜湯(しょうせいりゅうとう)」が粘膜のバリア機能を高めて、かぜやのど・鼻のトラブルを抑えます
- のどや鼻の粘膜が弱く、イガイガ・ヒリヒリ感から体調を崩しやすい方におすすめです

## 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症:  
気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

## 成分・分量

1日量(3本:90mL)中  
小青竜湯エキス 81mL

ハング6.0g、カンキョウ・カンゾウ・ケイヒ・ゴミシ・サイシン・シャクヤク・マオウ各3.0gより抽出

添加物として、安息香酸Na、ショ糖脂肪酸エステル、白糖、ハチミツ、パラベン、香料、エタノール、エチルパニリン、パニリン、プロピレングリコールを含有する

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 新生薬品工業株式会社

〒635-0103 奈良県高市郡高取町清水谷1269