

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください  
また必要ときに読めるよう大切に保管してください  
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



販売名：チクナインc

鼻炎用点鼻薬 第2類医薬品

### 製品特徴

- ちくのうを伴う副鼻腔炎による鼻づまりを緩和する点鼻スプレーです
- つらい鼻づまりを素早く鎮めます
- 殺菌成分配合です

### ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

#### 2. 長期連用しないこと



#### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

#### 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある

その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

#### 3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、  
頭重

(裏面につづく)

## 用法・用量

次の量を鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください

年齢	1回量	使用回数
大人(15才以上)	1~2度ずつ噴霧	1日1~5回
7才以上15才未満		
7才未満	× 使用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがある
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 点鼻用にのみ使用すること

<使用方法>

1. 使う前にやさしく鼻をかんでください(あまりきつくかまないでください)
2. キャップをはずして容器を持ってください(初めて使用する時は、必ず液が出るまでくり返し押してください)
3. ノズルの先を軽く鼻腔に入れ、薬液を1~2度噴霧してください。もう一方の鼻腔でも同じ操作をくり返してください
4. 容器を清潔に保つため、使用後は鼻に接する部分をティッシュペーパー等で拭いてからキャップをしっかりしめてください

- 容器を横にして使用しますと、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにしてお使いください
- ノズルの先端を針等で突くと折れた時大変危険ですので絶対におやめください

## 成分・分量 100mL 中

成分	分量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	0.05g	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれをおさえ、鼻づまりを改善します
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5g	鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます
リドカイン	0.5g	鼻炎による痛みやかゆみをやわらげます
グリチルリチン酸二カリウム	0.3g	鼻の炎症をしずめます
ベンザルコニウム塩化物	0.02g	鼻粘膜の細菌の増殖をおさえます

添加物として、グリセリン、pH調節剤を含有する

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

**小林製薬 お客様相談室**  
**0120-5884-01**  
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN