

第3類医薬品

販売名：ポンツシン内服液

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
(1) 次の症状のある人。胃酸過多
(2) 次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の眠気防止薬
3. コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と同時に服用しないこと
4. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

〔効能・効果〕

ねむけ、倦怠感の除去

〔用法・用量〕

成人(15才以上) 1日1回、1回1瓶(50mL)を添付のビニールストローにて服用する。なお、15才未満は服用しないこと。


(1) 1日2回以上の服用は避けること。(2) 用法・用量を厳守すること。

製造番号：C2001

使用期限：2015.3

〔年.月〕

目がさめる



ねむけ・だるさに

ポンツシン内服液

第3類医薬品



50mL×2

ゼリア新薬


〔成分〕1瓶(50mL)中
カフェイン水和物 ……200mg
ゴオウチンキ ……0.05mL
タウリン ……500mg
イノシット ……100mg
ビタミンB1塩酸塩 ……20mg
ビタミンB2リン酸エステル ……1.86mg
ビタミンB6 ……5mg
パントテン酸カルシウム ……10mg
添加物：L-グルタミン酸Na, DL-リンゴ酸, クエン酸, 白糖, ブドウ糖, l-メントール, 香料, グリセリン, エタノール


●本剤の服用により、尿が黄色になることがあるが、これは成分のビタミンB2リン酸エステルによるものですので、ご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931


(発売元)東京都中央区日本橋小舟町10-11
 **ゼリア新薬工業株式会社**
お客様相談室 ☎03-3661-2080
受付 9:00～17:50(土・日・祝日を除く)

製造販売元
 **Chosei 長生堂製薬株式会社**
徳島県徳島市国府町府中92番地



4 987103 032700

目がさめる



ねむけ・だるさに

ポンツシン内服液

第3類医薬品



50mL×2

ゼリア新薬