

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

■効能・効果■ 睡気(ねむけ)・倦怠感の除去

■用法・用量■

成人 (15歳以上)	1回 4粒	1日3回 1粒ずつを口中で噛み砕くか、 又は口中で溶かして服用して下さい。
15歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉 (1)用法・用量を厳守して下さい。(2)服用間隔は4時間以上として下さい。

■成分・分量■ 1日量(12粒)中

成分	分量
無水カフェイン	500mg

添加物：ショ糖脂肪酸エステル、カカオ、白糖、水アメ、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール

■保管及び取扱い上の注意■

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

カフェロップ 眠気防止薬

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないで下さい。
(1)次の症状のある人 胃酸過多
(2)次の診断を受けた人 心臓病、胃潰瘍
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の眠気防止薬
- コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないで下さい。
- 短期間の服用にとどめ、連用しないで下さい。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸



B0

®登録商標

製造販売元 高市製薬株式会社 奈良県高市郡明日香村野口10