

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 第2類医薬品

花粉、ハウスダスト等による鼻のアレルギー症状に

# エージーノーズ<sup>®</sup>アレルギーカット<sup>®</sup>M

## クロモグリク酸ナトリウム配合点鼻薬

### エージーノーズアレルギーカットMの特徴

1. 抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」が、アレルギー誘発物質の放出を抑え、つらいアレルギー症状を緩和します。
2. 「クロルフェニラミンマレイン酸塩」が、アレルギー症状を起こすヒスタミンの受容体結合をブロックし、くしゃみや鼻水を抑えます。
3. 「ナファゾリン塩酸塩」が、鼻粘膜のはれや充血を抑え、速やかに鼻づまりを改善します。
4. 「グリチルリチン酸二カリウム」が、アレルギー反応による鼻の炎症をしずめます。
5. 患部に留まり液ダレしにくい、モイストタイプの点鼻薬です。
6. どの角度からも噴霧可能なエアレス容器（移動弁式噴霧タイプ）を使用しています。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないで下さい。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
（眠気等があらわれることがあります）
3. 長期連用しないで下さい。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
  - (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	はれ、刺激感、鼻出血
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和：  
鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重(頭が重い)

## 使用法

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1度ずつ、両鼻腔内に 噴霧して下さい。	3~5回 (3時間以上の間隔を おいて下さい)
7歳以上15歳未満		
7歳未満	使用しないで下さい。	

(使用法に関連する注意)

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 7歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (4) 点鼻用のみ使用して下さい。

1. 使用前にていねいに鼻をかんで下さい。  
(あまりきつくかまないで下さい)
2. 青いキャップをはずして、図のように容器を持って下さい。(使い始めは、薬液が噴霧するまで数回、空押しして下さい)
3. ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、薬液を1回噴霧して下さい。もう一方の鼻腔でも同じ操作をくり返して下さい。
4. 使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めて下さい。



## 成分・分量

本剤は無色～微黄色半透明の粘稠な液で、100mL中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
クロモグリク酸ナトリウム	1g	アレルギー誘発物質の放出を抑え、つらいアレルギー症状を緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.25g	アレルギー症状を起こすヒスタミンの受容体結合をブロックし、くしゃみや鼻水を抑えます。
ナファゾリン塩酸塩	0.025g	鼻粘膜のはれや充血を抑え、速やかに鼻づまりを改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	0.3g	アレルギー反応による鼻の炎症をします。

添加物：カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、ベンザルコニウム塩化物、エドト酸Na、パラベン、pH調節剤、エタノール

(成分・分量に関連する注意)

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10