

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

第2類医薬品 胃のもたれ・不快感にスーッととけて効く

第一三共胃腸薬〔細粒〕a

第一三共胃腸薬〔細粒〕aの特徴

次のようなはたらきをもった薬剤で、胃のもたれ・不快感などにお使いいただけます。

- 脂肪消化酵素リパーゼAP12と消化酵素タカヂアスターゼN1が、消化を助けます。
- 6種の健胃生薬が弱った胃のはたらきを高め、胃の不快感・食欲不振などに効きめをあらわします。
- ロートエキスが胃液の分泌を抑制し、胃痛をしずめます。
- 生薬アカメガシワ、カンゾウ末が胃粘膜のあれ・ただれを修復します。
- 塩分のもととなるナトリウムを含んでいません。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
4. 長期連用しないで下さい。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

- もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸つかえ、食欲不振
- 胸やけ、胃痛、胃酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐



もたれに



胃部不快感に



胃痛に

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回 食後に服用して下さい。
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
3歳以上5歳未満	1/4包	
3歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、3包（1包1.3g）中に次の成分を含有しています。

成分	分量	はたらき
タカジアスターゼN1	150mg	広いpH域ではたらく消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくします。
リパーゼAP12	60mg	脂肪消化酵素で、消化作用をあらわします。
アカメガシワエキス <small>（アカメガシワとして504mg）</small>	63mg	胃腸の過度の緊張をおさえて、胃粘膜を保護し、胃の炎症をしずめます。
カンゾウ末	150mg	
ケイ酸アルミン酸 マグネシウム	1200mg	持続的な制酸作用を有し、かつ胃粘膜の炎症面を保護するはたらきもあります。また、合成ヒドロタルサイトは速効性もかねそなえています。
合成ヒドロタルサイト	450mg	
水酸化マグネシウム	600mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。
ロートエキス	30mg	胃液の分泌を抑制し、胃痛をしずめます。
オウバク末	105mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助けます。
ケイヒ末	225mg	
ウイキョウ末	60mg	
チョウジ末	30mg	
ショウキョウ末	75mg	
l-メントール	9mg	

添加物：セルロース、乳糖、ポリソルベート80、ヒドロキシプロピルセルロース、サンショウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10