

服用に際しては、この添付文書(説明文書)を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

腹部膨満感・整腸に ラッパ整腸薬BF®

指定医薬部外品

おなかの調子を整え、おなかの悩みからあなたを守ります。

【特長】

●消化管内にたまったガスの吸収と排出を促進します。

ジメチルポリシロキサンの消泡作用により、胃や腸管内で過剰にたまったガスの吸収と排出を促進します。

●3種類の乳酸菌が優れた整腸効果を発揮します。

ラクトミン(フェカリス菌とアシドフィルス菌)とビフィズス菌の3種類の乳酸菌がバランスよく配合されることにより小腸から大腸にかけて善玉菌が増え、乳酸や酢酸がつくられ、悪玉菌の増殖を抑え、優れた整腸作用を発揮します。

●のみやすい細粒です。

ラッパ整腸薬BFは、少し甘みのある、のみやすい白色細粒です。3才以上のお子様からお年寄りの方まで安心して服用していただけます。

●携帯に便利な分包(アルミ分包)です。

【使用上の注意】⚠

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の方は服用しないでください。

今までに本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみなど)を起こしたことがある方

相談すること

1.次の方は、本剤を服用する前に、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けておられる方
- (2)本人又は父母、兄弟姉妹がアレルギー体質の方
- (3)薬や化粧品などによるアレルギー症状を起こしたことがある方

2.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書(説明文書)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

【用法・用量】

次の量を食後(なるべく30分以内)に必ず水またはお湯といっしょに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください	

(用法・用量についての注意)

- (1)定められた用法・用量を必ず守ってください。
- (2)3才以上の幼小児に服用させる場合には、服用量のまちがいを起こさないように保護者の指導監督のもとに服用させてください。

裏面もお読みください。

【成分・分量】

3包(成人の1日最大服用量)中、次の成分を含みます。

成分		分量	はたらき	
ラクトミン	フェカリス菌	18mg	小腸ですばやく増え、軟便や便秘のときの乱れた腸内菌叢*の正常化に働きます。	整腸作用
	アシドフィルス菌		小腸で増え、乳酸をつくることにより悪玉菌の増殖を抑えて正常な腸内菌叢*の維持に働きます。	
ビフィズス菌		24mg	最も優勢な善玉菌として主に大腸にすみつき、乳酸と酢酸をつくることにより悪玉菌の増殖を抑えて優れた整腸効果を発揮します。	
ジメチルポリシロキサン		180mg	消化管内のガスの吸収と排出を促進し、腹部膨満感を解消します。	消泡作用

添加物として、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、乳糖、白糖、メチルセルロース、ポリソルベート80、ソルビタン脂肪酸エステル、無水ケイ酸、タルクを含有します。

*腸内菌叢(ちょうないきんそう)とは…人間の腸内にすみついているおよそ100種類100兆個以上の細菌の集団のことをいいます。健康な時には腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスは良いのですが、下痢や便秘、食生活の乱れ、ストレス、加齢などにより悪玉菌が増え、腸内菌叢が乱れます。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器には絶対に入れかえないでください。
- (3) 直射日光をさげ、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (4) 使用期限の過ぎたものは服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して湿気を防いで保管し、2日以内に服用してください。

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買求めの薬局、薬店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

大幸薬品株式会社 お客様相談係:電話 06-6382-1095

受付時間:午前9時～午後5時(土、日、祝日を除く)

製造販売元



大幸薬品株式会社

〒564-0032 大阪府吹田市内本町3丁目34番14号

技術提携



キッセイ薬品工業株式会社

長野県松本市芳野19番48号