ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに……

アネトン® せき止めZ液

〈鎮咳去痰薬〉
第②類医薬品

90760

アネトンせき止めZ液は、いろいろな原因で起こる**“せき”**をしずめ**“たん”**の切れをよくします。
また、さわやかなレモンティー風味の液剤です。

使用上の注意

してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. **次の人は服用しないでください**
   本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
   他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**（眠気等があらわれることがあります。）
4. **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**
5. **過量服用・長期連用しないでください**（倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。）

相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
   （1）医師の治療を受けている人。
   （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
   （3）乳児（乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック（アナフィラキシー）があらわれたとの報告があります。）。
   （4）高齢者。
   （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
   （6）次の症状のある人。
   高熱、排尿困難
   （7）次の診断を受けた人。
   心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
   便秘、口のかわき、眠気
4. **5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

【効能・効果】
せき、たん

【用法・用量】
年齢により次の量を服用してください。

年　　齢	1 回 量	1日服用回数	
成　人（15歳以上）	10mL	3回	症状により約４時間の間隔をおいて１日６回まで服用することができます。
11歳以上　15歳未満	6.5mL		
8歳以上　11歳未満	5mL		
5歳以上　8歳未満	3.3mL		
3歳以上　5歳未満	2.5mL		
1歳以上　3歳未満	2mL		
3ヵ月以上　1歳未満	1mL		
3ヵ月未満	服用しないでください。		

〈用法・用量に関連する注意〉
（1）用法・用量を厳守してください。
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
（3）2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】
アネトンせき止めZ液は淡褐色透明の液剤で、成人1日量（60mL）中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成　　分	分　量	はたらき
コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン)	50mg	せきを起こす中枢に作用し、せきをおさえるすぐれた効果があります。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支を拡張する作用と気管支のけいれんをおさえる作用により、せきをしずめます。
リゾチーム塩酸塩	60mg(力価)	のどにからまるたんを溶解して、出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン剤の一つで、アレルギーが原因となって起こるせきに効果があります。
無水カフェイン	60mg	頭痛、不快感をやわらげ、またねむけをおさえます。
セネガ流エキス	1500mg	気道粘液の分泌を亢進させ、たんをうすくし、出しやすくします。

添加物として、クエン酸Na、クエン酸、安息香酸Na、メチルパラベン、プロピレングリコール、グリセリン、D-ソルビトール、カラメル、香料、エタノール、pH調節剤を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉
本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】
（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
（4）使用期限（外箱及び容器に記載）をすぎた製品は服用しないでください。



【包装】
アネトンせき止めZ液：100mL

〈1回の服用量〉



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
武田薬品工業株式会社　ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668　東京都中央区日本橋二丁目12番10号　0120-567087
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html　電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
〒101-0065　東京都千代田区西神田3-5-2

販売元
武田薬品工業株式会社
〒540-8645　大阪市中央区道修町四丁目1番1号

©J&J KK 2013
®登録商標
90760