

この添付文書は、本剤の使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

# アスパラ<sup>®</sup>目薬モイストCL

目のかわき・コンタクトレンズ  
装着時の不快感に

Aspara

## コンタクトレンズ対応 潤い補助成分ヒプロメロース配合

アスパラ目薬モイストCLは、潤い補助成分のヒプロメロースが目じんにじんわり広がって、なみだの蒸発を抑えます。パソコンやスマートフォンなどの画面の凝視による瞬きの減少、エアコンによる空気の乾燥、コンタクトレンズ装着等による目のかわき(ドライアイ)でお悩みの方におすすです。いずれのコンタクトレンズ(ソフト、ハード、O<sub>2</sub>、使い捨て)<sup>\*</sup>をご使用の方にもお使いいただけます。

<sup>\*</sup>カラーコンタクトレンズ装着時には使用しないでください。



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。はげしい目の痛み
  - 次の診断を受けた人。緑内障

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 目のかすみが改善されない場合。
  - 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

### 効能

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

## 用法・用量

1日5～6回、1回2～3滴点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときでも使用できます。




## 成分(100mL中)

成分	含量	はたらき
塩化ナトリウム	516mg	なみだの不足を補います。
ヒプロメロース	300mg	なみだの蒸発を抑え、潤いを保持します。

添加物: デキストラン70、ホウ酸、D-マンニトール、エデト酸Na、  
塩化ポリドロニウム液、pH調整剤

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。  
(品質を保持するため車中・暖房器具の近くなど高温となる場所に保管しないでください。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白く付くことがあります。このような場合には清潔なガーゼなどで軽くふき取って使用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



※うるおいを持続させるため、薬液に粘性を持たせております。そのため点眼後、しばらく視野がぼやけることがありますのでご注意ください。



販売元  
田辺三菱製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元  
TS テイカ製薬株式会社  
富山市荒川一丁目3番27号

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

田辺三菱製薬「くすり相談センター」  
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)  
受付時間: 弊社営業日の9:00～17:30

ホームページ [www.mt-pharma.co.jp](http://www.mt-pharma.co.jp)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)