

2013年4月改訂

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

痛くてガマンできない  
ときの〈頓服〉に

KONJISUI TONPUKU

第②類医薬品

コンジスイ  
とんぷく  
解熱鎮痛剤

(8包入)

コンジスイとんぷくは、歯痛・頭痛などで痛くてガマンできないとき、痛みを速やかに鎮めるため、四種の成分を配合した頓用の鎮痛薬です。白色の顆粒でのみやすく、胃の中で早く分散、溶解して胃障害の心配を軽くしています。



### ご使用上の注意



#### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は、服用しないでください。
    - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
    - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してせんそくを起こしたことがある人。
    - 7歳未満の小児。
  - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
  - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
  - 服用前後は飲酒しないでください。
  - 長期連用しないでください。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児(15歳未満)。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
せんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	尿量減少、発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効 能

- 歯痛・抜歯後の痛みを鎮める。
- 頭痛・月経痛（生理痛）・神経痛・肩こり痛・腰痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・打撲痛・ねんざ痛を鎮める。
- 悪寒・発熱時の解熱。

## 成分・分量

1包(1.3g)中

エテンザミド……………500mg  
アセトアミノフェン……………300mg  
プロモバレリル尿素……………180mg  
無水カフェイン……………80mg  
添加物としてセルロース、サッカリンNa  
水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、  
無水ケイ酸、香料、乳糖水和物を含有。

## 用法・用量

15才以上	11才以上～15才未満	7才以上～11才未満
1回 1包	1回 2/3包	1回 1/2包

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

包 装 1.3g × 8 包入

姉妹品

急な歯痛に…  
すばやい効果の **新今治水**  
携帯に便利でつけやすいゲル状の **コジイ Q**

**丹平製薬株式会社**

大阪府茨木市宿久庄2丁目7番6号  
お客様相談室フリーダイヤル(0120)500-461  
(9:00～17:00まで、土・日・祝日を除く)  
<http://www.tampei.co.jp>