

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 口腔内消炎薬

7mL

第3類医薬品

口内炎 のどの痛み



- 患部へ噴射塗布した時にしみにくいミスト状のスプレー タイプです。
- 子供も大好きな「ぶどう味」です。
- 炎症や痛みを鎮める、植物由来（カミツレ）の抗炎症成分 を水溶性にしたアズレンヌルホン酸ナトリウム水和物を配 合しています。

### △ 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 次の症状のある人…口内のひどいいたれ。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って 医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
口	刺激感
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5~6日間使用しても症状が良くならない場合

#### 効能・効果

- 口内炎 ● のどの炎症によるのどの痛み・のどのあれ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

#### 用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。なお、初回 使用時は、薬液が出るまで数回押してください。

#### 用法・用量に関する注意

- (1) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入るこ とがありますので、のどの奥に使用する場合には、声を 出しながら噴射してください。
- (2) 使用中、噴射口が口内に触れないようにしてください。
- (3) 用法・用量を厳守してください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに 使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った 場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、 症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

#### 成分・分量 (100g 中)

成分	含量	作用
アズレン スルホン酸 ナトリウム水和物	0.02g	粘膜に直接作用し炎症を鎮め、 痛み・はれ等の症状を改善し ます。

添加物としてグリセリン、エデト酸Na、D-ソルビトール、 サックカリニンNa、リン酸水素Na、炭酸水素Na、セチルビ リジニウム塩化物水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、 エタノール、香料を含有。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップ を閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になっ たり品質が変わります。)
- (4) 使用期限 (外箱に記載) を過ぎた製品は使用しないでく ださい。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の 点からなるべく早く使用してください。
- (5) 薬液が衣類に付着した時は、水で洗い流してください。



丹平製薬株式会社

大阪府茨木市宿久庄2丁目7番6号  
お客様相談室 フリーダイヤル(0120)500-461  
(9:00~17:00まで、土・日・祝日を除く)  
<http://www.tampei.co.jp>