



【例】貼り方

サロパス®  
160枚入  
第3類医薬品  
直径2.5cm  
温感刺激が患部の血行を促進

Salopas®  
第3類医薬品



肩こり・腰痛に  
ピンポイント!  
生薬配合  
微香性 ● やさしい貼りこころ



第3類医薬品  
160枚入  
サイズ：直径2.5cm

サロパス®  
温感刺激が患部の血行を促進

製造番号  
使用期限  
温感刺激が患部の血行を促進  
サロパス®  
160枚入  
第3類医薬品  
サイズ：直径2.5cm

サロパス®  
温感刺激が患部の血行を促進  
Hisamitsu®

サロパス®  
160枚入  
第3類医薬品  
温感刺激が患部の血行を促進

特長  
● 生薬配合、温感刺激で患部の血行を促進し、こりや痛みを効果的にやわらげます。  
● 丸型ミニサイズなので、肩・背中・腰・ふくらはぎなどの場所を選ばず、ピンポイントで使用できます。  
● やわらかい生薬配合なので、可動部位に貼ってもはがれにくく安心です。  
● 外出先でも気軽に使える微香性タイプ。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

温感刺激が患部の血行を促進  
販売名：サロパス®  
〈鎮痛消炎プラスター〉

第3類医薬品  
160枚入  
サイズ：直径2.5cm

詳しい情報は  
こちらへ▶



△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと  
守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。  
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に必ず医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着、皮膚はく離

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効果・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、関節痛、骨折痛、しもやけ

用法・用量

1日数回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)	添加物として、酸化チタン、水酸化アルミニウム、水添ロジングリセリンエステル、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、テルペン樹脂、ポリイソブチレン、流動パラフィン含有します。
サリチル酸グリコール	2.55g
l-メントール	5.11g
オウバク末	1.70g
トコフェロール酢酸エステル	0.43g
ノニル酸ワニリルアミド	0.016g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。

こまめに  
押し開けて  
ください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。  
製造販売元 久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>  
お客様相談室： ☎ 0120-133250 受付時間 / 9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)  
副作用被害救済制度のお問い合わせ先： (独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html) ☎ 0120-149-931



1BAA0A