

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

ここを押し開けてください。

包装 10枚(7cm×10cm)
経皮鎮痛消炎テープ剤
第2類医薬品
販売名: フェイタス®5.0 温感

⚠ 使用上の注意
❌ してはいけないこと
[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) ぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、痛み、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果
関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量
表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
(1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
(2) 定められた用法・用量を守ってください。
(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
(4) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
(5) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
(6) 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
(7) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
(8) 皮膚の弱い人は、同じ所に続けて使用しないでください。

成分・分量(膏体100g中)

フェルピナク	5.0g
ℓ-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g
(*ビタミンE誘導体)	
ノニル酸フニルアミド	0.0085g

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、ステレン・インブレン・ステレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリソプチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。
- (5) 使用期限(この箱及び薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

フェイタス®5.0 温感 第2類医薬品

特長
●効きめ成分フェルピナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
●ノニル酸フニルアミドのほらほら感により、患部の血行を促進します。
●ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
●微香性です。
●全方向伸縮で、肌にとびつきフィットします。

詳しい情報は こちら



第2類医薬品 **フェイタス®5.0 温感** 10枚入
サイズ:7cm×10cm

Hisamitsu®

10枚入
サイズ:7cm×10cm

保存に便利なチャック付き

フェイタス® 5.0

フェルピナク配合テープ剤

肩などの 続く **痛み** に **温感**



直接浸透!

ビタミンE 配合

微香性

セルフメデケーション 税 控除 対象

ピッタリフィット 全方向伸縮

第2類医薬品

製造番号 使用期限

フェイタス®5.0 温感 10枚入
第2類医薬品
サイズ:7cm×10cm

フェイタス®5.0 温感 第2類医薬品

久光製薬株式会社
お薬相談センター: 0120-133250
受付時間: 9:00~17:50(土日・祭日・会社休日を除く)
副作用被害救済制度: 0120-149-931
http://www.hisamitsu.co.jp

4 987188 124444

第2類医薬品
 フェイタス5.0 温感
 久光製薬株式会社
 〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408番地
 http://www.hisamitsu.co.jp
 受付時間/9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)
 お客様相談室: ☎0120-133250

第2類医薬品
 フェイタス5.0 温感
 10枚入
 サイズ:10cm×14cm
 4 987188124482

第2類医薬品
 微香性
 広い部位を1枚でおおえる
 ビタミンE配合
 10cm×14cm
 大判サイズ
 腰などの続く痛みに
 直接浸透!

フェイタス5.0 温感
 Hisamitsu
 10枚入
 サイズ:10cm×14cm

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要ときにすぐ読めるように大切に保管してください。 包装 10枚(10cm×14cm)

●効きめ成分フェルピナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
 ●肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。
 ●ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
 ●ノニル酸ワニルリアミドのはたらきで、心地よい温感作用をあらわします。

●微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
 ●全方向伸縮で、肌にピッタリフィットします。
 ●腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。

△ 使用上の注意

☒してはいけないこと
 [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、痛み、ビリビリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果
 関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量
 表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉
 (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。(2) 定められた用法・用量を守ってください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。(5) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(6) 強い刺激を感じる場合がありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(7) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(8) 皮膚の弱い人は、同じ所に続けて使用しないでください。

成分・分量 (膏体100g中)

フェルピナク	5.0g	ℓ-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル(*ビタミンE誘導体)	2.3g		
ノニル酸ワニルリアミド	0.0085g		

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- 開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 使用期限(この箱及び薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

ここを押し開けてください。

1BA43A