

携帯に便利な  
薬袋包装!!

Hisamitsu®

10枚入  
サイズ:7cm×10cm

# フェイタス<sup>®</sup> 5.0

フェルビナク配合テープ剤



当社従来品に比べて  
パッケージ(外箱)を省き  
紙の使用量を減らしました。

肩などの

# 痛み

に  
直接浸透!

セルフメディケーション  
税控除対象

ビタミンE<sup>®</sup>  
配合

微香性

ピッタリフィット  
全方位伸縮

第2類医薬品

■本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

お客様相談室：TEL.0120-133250 受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 久光製薬株式会社

〒841-0017 烏橋市田代大官町408番地

<https://www.hisamitsu.co.jp>



4 987188 124406

↑↑↑↑↑↑ 切り口  
↑↑↑↑↑↑ 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。  
↑↑↑↑↑↑

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

↑↑↑↑↑↑ 切り口  
↑↑↑↑↑↑ 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。  
↑↑↑↑↑↑

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

## ▲ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ゼンそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。2. 次の部位には使用しないでください。(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 温疹、かぶれ、瘡口。(3) みずみしめたむし等又は化膿している患部。3. 連続して2週間以上使用しないでください。

### ☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重複的な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

経皮鎮痛消炎テープ剤  
販売名：フェイタス<sup>®</sup> 5.0

第2類医薬品

### ＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 15歳未満の小児に使用させないでください。(2) 定められた用法・用量を守ってください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 汗をかいだり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用の際に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2㎠角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

### 成分・分量 (青体100g中)

フェルビナク	5.0g
β-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g
(*ビタミンE誘導体)	

添加物として、水溶性ロジングリセリンエステル、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、HHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他成分を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光や高温を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。(5) 使用期限(この薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

お客様アンケート：

商品情報は  
こちらへ▶

2E190T



製造番号

使用期限

### 効能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

### 用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

印字範囲

41×25 mm

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。→ → →

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

携帯に便利な

薬袋包装!!

hisamitsu<sup>®</sup>

10枚入  
サイズ:10cm×14cm

# フェイタス<sup>®</sup> 5.0

フェルビナク配合テープ剤



当社従来品に比べて  
パッケージ(外箱)を省き  
紙の使用量を減らしました。

腰などの  
**痛み**  
に  
直接浸透!

大判サイズ

10cm×14cm

ビタミンE  
配合

広い部位を  
1枚でおおえる

微香性

セルフメディケーション  
税控対象

第2類医薬品

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。→ → →

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

## 特長

- 効きめ成分フェルビナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
- 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
- 肩・腰・関節・筋肉の痛みに優れた効きめをあらわします。
- 全方向伸縮で、肌にピッタリフィットします。
- ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
- 腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。
- 2-メントール3.5%配合で、さわやかな清涼感です。

## △ 使用上の注意

### してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

#### 1. 次の人は使用しないでください。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)温疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している部位。

#### 3. 連続して2週間以上使用しないでください。

## 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■ 本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、  
又は下記の「お客様相談室」までお問い合わせください。

製造販売元  
〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408番地  
お客様相談室：TEL.0120-133250  
受付時間／9:00～17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度  
TEL.0120-149-931



製造番号  
使用期限

捺印範囲

お客様  
アンケート・  
商品情報は  
こちらへ▶



久光製薬の環境への取り組み  
HELLO eco!プロジェクトの  
詳細はこちへ▶

<https://www.hisamitsu.co.jp>

効能・効果  
関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み  
用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

## 用法・用量に関する注意

(1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)定められた用法・用量を守ってください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4)汗をかいたり皮膚がぬれています時は、よくふき取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量(液体100g中)

フェルビナク ..... 5.0g ℓ-メントール ..... 3.5g

トコフェロール酢酸エステル(\*ビタミンE誘導体) ..... 2.3g

添加物として、水添ロジングリセリンエスチル、スチレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリソブレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光や高温をさけ、温湯の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4)開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。(5)使用期限(この薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。