

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要ときにすぐ読めるように大切に保管してください。

Hisamitsu®

第2類医薬品

肩・首・腰のつらい痛み

微香性

フェイタス[®] ジクサス[®] ギェル 50g

経皮鎮痛消炎剤

フェイタスZαジクサス ギェルは、優れた抗炎症・鎮痛効果が認められている「ジクロフェナクナトリウム」を1.0%配合した経皮鎮痛消炎剤です。

- 効きめ成分ジクロフェナクナトリウムが、肩・腰・関節・筋肉の痛み

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。
 - (3) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (4) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の医薬品の投与を受けている人。
ニューキノロン系抗菌剤
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、皮膚のあれ、刺激感、色素沈着、水疱、落屑(皮膚片の細かい脱落)

まれに裏面の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
シヨック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎 光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がる場合があります。また日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

1日3～4回、適量を患部に塗擦してください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2)用法・用量を厳守してください。
- (3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用のみに使用してください。
- (6)1週間あたり、50gを超えて使用しないでください。
- (7)同じ部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (8)通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。
- (9)使用後は手を洗ってください。

成分・分量(100g中)

成分	含量	成分	含量
ジクロフェナクナトリウム	1.0g	グリチルレチン酸	0.05g
ℓ-メントール	4.5g	ノニル酸ワニルアミド	0.02g

添加物として、エタノール、ジエタノールアミン、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、トウガラシチンキ、BHT、ヒドロキシプロピルセルロース、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、繊維の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (6)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
http://www.hisamitsu.co.jp

お客様相談室： ☎ 0120-133250 受付時間/9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)



2519HC