

1枚ずつ 取り出しやすい ポケシップ®



シップの
サイズ
そのまま



当社従来品に比べて
薬袋のプラスチック
使用量を減らしました。

Hisamitsu®

10 枚入
サイズ: 10cm×14cm

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

1日2回を限度として患部に貼付してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (2) 定められた用法・用量を守ってください。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量(膏体100g中)

フェルビナク……………0.7g

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、N-メチル-2-ピロドン、l-メントール、グリセリン、ケイ酸AI、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリacrylic酸部分中和物、ポリビニルアクリレート(部分けい化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。(5) 開封後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。

【ご使用方法】○表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。○中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールを元のようにしっかりと閉めてください。



4 987188 123980

製造
番号

使用
期限

袋 : PE, M, PET
シールふた : PET, PP 4E180M

フェイタス シップ® 冷感

フェルビナク配合シップ剤 第2類
医薬品

関節・筋肉 痛み 直接浸透



丸かど® シップ

ピッタリフィット!
全方向伸縮自在!

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

久光製薬株式会社

〒841-0017 烏栖市田代大宮町408番地
[https://www.hisamitsu.co.jp](http://www.hisamitsu.co.jp)

▲当社HELLO!eco!プロジェクトの詳細はこちらへ。副作用被害救済制度: ☎ 0120-149-931

セリヌメテックーション
※控除対象

お客様アンケート
商品情報は
こちらへ▼



ご使用に際して、この説明書を必ず
お読みください。また、必要なとき
にすぐ読めるように大切に保管し
てください。

包装10枚(10cm×14cm)
日本薬局方 フェルビナクパック
販売名: フェイタス®シップ

第2類医薬品

△ 使用上の注意

×してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化し
たり、副作用が起こりやすくなり
ます。]

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によ
りアレルギー症状を起こしたこと
がある人。(2) 肝そりを起こしたこ
とがある人。(3) 妊婦又は妊娠し
ていると思われる人。(4) 15歳未
満の小児。2.次の部位には使用し
ないでください。(1) 目の周囲、粘
膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
(3) みずみし・たむし等又は化膿
している患部。3.連続して2週間
以上使用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人には使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー
症状を起こしたことがある人。2.
使用後、次の症状があわせた場
合は副作用の可能性がありますので、
直ちに使用を中止し、この袋を
持つて医師、薬剤師又は登録販売
者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、 かゆみ、ヒリヒリ 感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起る
ことがあります。その場合は直ち
に医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ (ラキシ)-)	使用後すぐに、皮 膚のかゆみ、じんま しん、声のかすれ、 くしゃみ、のどのか ゆみ、息苦しさ、動 悸、意識の混濁等 があらわれます。

3.5~6日間使用しても症状がよ
くならない場合は使用を中止し、
この袋を持って医師、薬剤師又は
登録販売者にご相談ください。