

効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)

サリチル酸グリコール …………… 2.0g

ℓ-メントール …………… 1.0g

トコフェロール酢酸エステル …… 1.0g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エトナトトリウム、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。



製造番号
使用期限

袋 : PE, M, PET
シールふた : PP, PET 1E191M

1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®




シップの
サイズ
そのまま

Hisamitsu® **10**枚入
サイズ:10cm×14cm

外用薬
経皮鎮痛消炎剤

のびのび®
サロンシップ® フィット®



冷感

第3類医薬品

筋肉痛・筋肉疲労・ねんざ・肩こり・腰痛

シップの端からはがれにくい



丸かどシップ
▲開け口

シールが破れて
いる時は使用し
ないでください。

薄い・密着
はがれにくいシップ

微香性

詳しい情報は
こちらへ▼



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社**
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp

お客様相談室: TEL.0120-133250
受付時間 / 9:00-17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)

セルフレジ決済対象

▲当社HELLO!eacolプロジェクトの詳細はこちらへ。 副作用被害救済制度: ☎0120-149-931

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

〈冷感〉鎮痛消炎シップ剤

販売名: のびのび®サロンシップ®フィット®

10枚入
サイズ: 10cm×14cm

【ご使用方法】○表面のシールを開け口の
ところから開け、1枚ずつ取り出して
お使いください。○中身の乾燥を防ぐ
ため、ご使用後はシールを元のよう
にしっかり閉めてください。

▲ 使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状
が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります。

次の部位には使用しないで
ください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、
薬剤師又は登録販売者
にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわ
れた場合は副作用の可能
性がありますので、直ちに
使用を中止し、この袋を持っ
て医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、 かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状
がよくならない場合は使
用を中止し、この袋を持っ
て医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください。