


この説明文書は、本剤とともに
保管し、服用の際には、よくお読みください。

シュガーレス〈サイダー味〉

鼻炎薬 浅田飴こども鼻炎S

第2類医薬品


【使用上の注意】

してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。〕

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の鼻炎薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)。3. 長期連用しないでください。

相談すること

 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)高齢者(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(5)高熱、排尿困難のある人(6)緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧の診断を受けた人 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

〔皮膚〕発疹・発赤、かゆみ 〔消化器〕吐き気・嘔吐、食欲不振 〔精神神経系〕頭痛 〔泌尿器〕排尿困難 〔その他〕顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。〔再生不良性貧血〕青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。〔無顆粒球症〕突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

口のかゆき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状が
よくなる場合は服用を中止し、この説明文書
を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

【用法・用量】

次の量を口中で溶かすか、又はかみくだいて服用してください。
ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	7～14才	5～6才	5才未満
1回量	2錠	1錠	服用しないこと
服用回数	1日3回		

※1度に2錠を口中に含まず、1錠ずつ服用してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】6錠中

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……3mg フェニレフリン塩酸塩……15mg

ベラドンナ総アルカロイド……0.3mg

添加物としてアセスルファミK、還元麦芽糖水アメ、塩化Na、還元水アメ、DL-リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、アラビアゴム、カルナウバパウ、ポリソルベート80、l-メントール、タルク、サランミツロウ、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にフタをしっかりとめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。

製造販売元  株式会社 浅田飴

東京都東村山市久米川町5-29-7

お問合せ先 お客様相談室 03-3953-4044

時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

0121M1