ストレスなどによる胃の不快症状にスーッと効く!

パンシロン®キュア

胃痛・胃酸逆流などによる胸やけに

顆粒タイプ

サッと溶けて

胃酸に速攻
(速効性制酸剤配合)

ロート製薬

30包

税 控除対象

第2類医薬品

ACESSIBLE

English | 简体中文 | 繁體中文

■効能・効果 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、一日酔、悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)

■用法・用量 次の量を食前または食後に水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)用法・用量を厳守すること。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

U-1

13946020F

■成分・分量(3包中)

有効成分	配合量	有効成分	配合量
水酸化マグネシウム	450mg	アルジオキサ	150mg
合成ヒドロタルサイト	780mg	ピレンゼピン塩酸塩水和物	46.9mg
沈降炭酸カルシウム	900mg	チンピ末	300mg
炭酸水素ナトリウム	240mg		

添加物:L-アルギニン、キシリトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ℓ-メントール、香料

使用期限 製造番号

セルフメディケーション 税 控除対象

紙

4 987241 139460

■保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

販売名:パンシロンキュアSP
STOMACHCSACID REDUCER
(for heartburn relief)

胃腸薬

第2類医薬品

R·eco 対象品はカンタン手続き健康応援ポイント対象

お客さま安心サポートデスク
東京:03-5442-6020
大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00
(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

胃痛・胸やけにトリプルアクション®が効く!!

- 酸っぱいものが上がってきて胸やけする
- 空腹時に胃が痛くなる
- ムカムカする、胃に不快感を感じる

食前の空腹時にも、食後にも飲める

1.260g×30包

▼切りはなして取り出しやすくできます▼

こみ上げる吐き気…それって胃酸の逆流が原因かも!?

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人 (2)授乳中の人 (3)高齢者 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人:排尿困難 (6)次の診断を受けた人:緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害、フェニルケトン尿症 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状	関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	循環器	動悸	その他	目のかすみ
消化器	吐き気・胃部膨満感	泌尿器	排尿困難		

まれに下記の重篤な症状があらわれることがあるので、その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
アナフィラキシーショック	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。便秘、下痢、口のかわき 4.過剰に服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

1.使用上の注意

- 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
- 高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

2.相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人 (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)透析療法を受けている人 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。(眠のおそれがあり、異常な事故につながるおそれがあります。) 4.長期連用しないこと。

3.その他の注意

- 誤って飲み込んだ場合、口の中に残った場合、目に入った場合、皮膚に付着した場合は、水で洗い流すこと。
- 本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)透析療法を受けている人 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)透析療法を受けている人

4.保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

押してあける