

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:アルガード持続性鼻炎シールド24h

第2類医薬品

アレルギー用薬

12カプセル

12日分

# ロート アリガード<sup>®</sup> 持続性鼻炎シールド 24h

医療用と同量配合<sup>\*</sup>  
エピナステチン 塩酸塩 最大量\*  
配合

## 製品特長

- 寝る前に飲むから、朝から花粉つらくない!
- 24時間効果持続!
- 1日1回1カプセルでOK!

\*持続性 エピナステチン塩酸塩20mg配合(1カプセル中)

\*既承認一般用鼻炎薬中

## 使用上の注意 ▲

 **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 15才未満の小児。
  - (3) 次の診断を受けた人。  
肝臓病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乘物酔い薬、催眠鎮静薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用前後は飲酒しないでください。



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
  - (6) 気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。
  - (7) エピナステチン塩酸塩を10mg含有する医薬品から本剤に変更しようとしている人。

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感、腹痛、胃重感、胃もたれ感、腹部膨満感、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、頭痛、頭がボーッとする、しびれ感、悪夢、幻覚、幻聴
呼 吸 器	息苦しい
循 環 器	動悸
泌 尿 器	排尿困難、頻尿、血尿、蛋白尿
そ の 他	むくみ、ほてり、胸痛、痰がからむ、倦怠感、鼻づまり、月経異常、苦味を感じる、味覚が弱くなる、女性化乳房(男性に見られる女性のような乳房)、乳房が大きくなる

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、便秘、下痢、眠気

4.1週間位服用(他のエピナステチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む)しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5.症状の改善がみられても2週間(他のエピナステチン塩酸塩を含有する医薬品の服用期間を含む)を超えて服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：  
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり

#### 用法・用量

次の1回量を1日1回、就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成 人(15才以上)	15才未満
1回量	1カプセル	服用しないでください

#### <用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。  
(2)花粉などの季節性のアレルギー性鼻炎症状に使用する場合は、花粉飛散予測日から、又は、症状が出始めたら早めに服用を始めると効果的です。  
(3)カプセルの取り出し方／下図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる  
など思わぬ事故につながります。)



#### 成分・分量(1カプセル中)

エピナステチン塩酸塩……20mg

添加物：マクロゴール、ショ糖脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、カラメル ※本剤は天然由来原料を使用しているため、カプセルの色が多少異なることがあります。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります。)  
(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。



お問い合わせ先 ロート製薬お客様安心サポートデスク  
この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」ロートサポートスクです。  
**東京:03-5442-6020**  
**大阪:06-6758-1230**  
受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

【発売元】 **ロート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1

【製造販売元】 **森下仁丹株式会社**  
大阪市中央区玉造1-2-40