

第2類医薬品

気圧の変化による頭痛に効く

4錠×6包
(24錠入)

携帯に便利な個別包装

キアガード

和漢箋
ロート製薬

<販売名>キアガード
満量処方** 五苓散

押してあける

第2類医薬品

その頭痛、気圧の変化が原因かも？

雨が降る前のどんより曇り(気圧の変化時)などに頭痛がおきていませんか？

キアガードは漢方の働きで気圧の変化などによる頭痛症状を抑えるお薬です。脳の血管が拡張して、神経が圧迫されることが頭痛発生のメカニズムの1つとされています。

気圧の下がり始めなど、頭痛が来たなと思ったら、我慢せずに早めに対処しましょう

**満量処方とは、日本薬局方五苓散の生薬全量(最大量)からエキスを得た処方です。

【用法・用量】

次の量を1日3回食前又は食間に水又はお湯で服用してください。

※食間とは、食後2～3時間を指す。

年齢	1回量
成人(15才以上)	4錠
5才以上15才未満	2錠
5才未満	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

相談すること ▲ 使用上の注意

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔い)に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたり(急性胃腸炎)に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

ロート製薬株式会社 お客様安心サポートデスク:06-6758-1230
大阪市生野区箕野1-8-1 受付時間 9:00～18:00(土、祝日を除く)



使用期限
製造番号



【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気のかからない所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れて保管しないこと。(使用の原因になった)品名がかわる(4)使用期限を過ぎた薬品は服用しないこと。(5)使用期限が切れても薬品は薬の力を失っていないので、そのまま使用すること。(5)1包を分別して服用した場合、残った薬品は他の包を併用しないこと。(6)1包以外に服用する場合は、残った手で開けること。(7)薬品により、髪や衣類に染色や変色を及ぼす場合があります。お肌の手で開けること。
副作用被害救済制度の問合せ先:0120-149-931

ココロ・パルク
ココロ・パルクに、
あなたの貴重なご意見を
お聞かせください。
https://ccco.rohto.com/p/7163939

ロート製薬

和漢箋
わかんせん

錠剤タイプ 24錠
(6包)
原寸大

キアガード



天気(気圧)の変化 などによる 頭痛に

逃れられない頭痛に効く!

*天気(気圧)の変化などによる頭痛

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ない
もので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどの
いずれかを伴う人の頭痛

漢方製剤

第2類医薬品

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔い
<効能・効果に関連する注意>しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものである。
<成分・分量>12錠中
五苓散エキス 2.175g (タウシヤ4.0g、チヨレイ3.0g、ブリヨウ3.0g、ソウジュツ3.0g、ケイヒ1.5gより抽出)
添加物として、カルメロール、クロスカルメロール、各水二重位、ステアリン酸マグネシウム、タルク、結晶セルロースを含有する。*本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

16393919B