

【用法・用量】

次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---------------|------------|--------|
| 成人 (15才以上) | 1本 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないでください | |

食間とは…食後2～3時間をさします。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【効能・効果】

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931

ロート製薬**和漢箋**

わかんせん®

つらい
症状に!

液剤だからすぐ飲める

ドリンク
30mL×3本
(15才以上)

補中益気湯

満量処方
ほちゅうえつきとう

弱った身体を
強くすることで
元気がない方の虚弱体質を改善する漢方

<販売名> 新生補中益気湯内服液

第2類医薬品

**【成分・分量】**

本品1日量 90mL(30mL×3本)中
補中益気湯濃縮液…81mL
(下記生薬の水製抽出液)

日局ニンジン……………4g
日局ビャクジュツ……………4g
日局オウギ……………4g
日局トウキ……………3g
日局チンピ……………2g
日局タイソウ……………2g
日局サイコ……………1g
日局カンゾウ……………1.5g
日局ショウキョウ……………0.5g
日局ショウマ……………0.5g
添加物：白糖、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(箱及びラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)開栓後はすぐにお飲みください。開栓後のものを保管しないでください。

販売名:

新生補中益気湯内服液

押してあける

第2類医薬品

漢方製剤

この外箱は本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

⚠【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5) 次の症状のある人。むくみ
(3) 高齢者。 (6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

発売元: **ロート製薬株式会社**

大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元: **新生薬品工業株式会社**

奈良県高市郡高取町清水谷1269

お問い合わせ先: **ロート製薬お客様安心サポートデスク**

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届けたい」サポートデスクです。

東京: **03-5442-6020** 受付時間 9:00～18:00
大阪: **06-6758-1230** (土、日、祝日を除く)

【用法・用量】

次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---------------|------------|--------|
| 成人 (15才以上) | 1本 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないでください | |

食間とは…食後2～3時間をさします。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【効能・効果】

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931

ロート製薬**和漢箋**

わかんせん®

つらい
症状に!

液剤だからすぐ飲める

ドリンク
30mL×3本
(15才以上)

補中益気湯

満量処方
ほちゅうえつきとう

弱った身体を
強くすることで
元気がない方の虚弱体質を改善する漢方

〈販売名〉新生補中益気湯内服液

第2類医薬品

**【成分・分量】**

本品1日量 90mL(30mL×3本)中
補中益気湯濃縮液…81mL
(下記生薬の水製抽出液)

日局ニンジン……………4g
日局ビャクジュツ……………4g
日局オウギ……………4g
日局トウキ……………3g
日局チンピ……………2g
日局タイソウ……………2g
日局サイコ……………1g
日局カンゾウ……………1.5g
日局ショウキョウ……………0.5g
日局ショウマ……………0.5g
添加物：白糖、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(箱及びラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)開栓後はすぐにお飲みください。開栓後のものを保管しないでください。

販売名:

新生補中益気湯内服液

押してあける

第2類医薬品

漢方製剤

この外箱は本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

⚠【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (5) 次の症状のある人。むくみ
(3) 高齢者。 (6) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

発 売 元: **ロート製薬株式会社**
大阪市生野区巽西1-8-1

製造販売元: **新生薬品工業株式会社**
奈良県高市郡高取町清水谷1269

お問い合わせ先: **ロート製薬お客様安心サポートデスク**

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに届けたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 受付時間 9:00～18:00
大阪:06-6758-1230 (土、日、祝日を除く)