

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:ロートアルガードエピナスチン点眼薬

抗アレルギー点眼薬

要指導医薬品

# ロートアルガード®

## エピナスチン点眼薬

### 花粉などによるつらい目のかゆみに 早めの対処で速攻ケア!

#### Point 1 目のかゆみにしっかり効く

アレルギー原因物質（ヒスタミンなど）の放出を原因から抑えます。

#### Point 2 目のかゆみが出にくくなります

早期使用（花粉飛散1～2週間前から）により、アレルギー症状の発症を抑えます。

### 使用上の注意 ⚠

してはいけないこと ☒（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

#### 1 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

#### 相談すること

#### 1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人
- (5) アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児
- (6) 次の症状のある人 はげしい目の痛み、強い異物感
- (7) 眼球乾燥症候群（ドライアイ）の診断を受けた人又はその恐れがある人
- (8) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人

とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるので、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 片方の目だけに症状がある場合
- 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- 視力が低下した場合
- 黄緑色など色がついた粘り気がある目やにの多い場合

#### 2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤
目	刺激感・しみる*、異物感、目がまぶしい、痛み*、なみだ目、かゆみ*、はれ*、充血、目やに、目のかすみ

\*目のまわりを含む

#### 3 次の場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 1週間位使用しても症状がよくならない場合

ただし、以下の場合は他の疾患の可能性があるので、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

- 視力低下、目の痛みが発現した場合
- 症状が悪化した場合



- 4 症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合は、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和: 目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

## 用法・用量

1回1滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
(汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる)また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。
- (6) 用法・用量を厳守してください。
- (7) 花粉など季節性のアレルギーによる症状に使用する場合は、花粉飛散開始の1~2週間前から、又は花粉の飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。
- (8) 点眼後1~5分間、目を閉じて目頭を軽く手で押さえてください。
- (9) 他の目薬と併用するときは、少なくとも5分以上間隔をあけてください。



## 成分・分量

有効成分	配合量
エピナスチン塩酸塩	0.05%

添加物として、塩化Na、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、ホウ酸、エデト酸Na、pH調節剤を含有する。

## 保管および取扱上の注意

- (1) 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。



## お問い合わせ先

製品についてご意見やご要望、お困りごとやお悩みなどがございましたら、お気軽にご連絡ください。  
あなたのお声におこたえします。



コミュニケーションコール(お客様相談室)

0120-610-755

受付時間 / 9:00~17:00(土、日、祝除く)

**ROHTO** ロート製薬株式会社  
大阪市生野区糞西1-8-1