

お出かけのあとに

お口の

殺菌・消毒


を

ポビドン
ヨード製剤

使用法

添付の計量カップを斜めにして
本剤を2～4目盛のところまで
入れ、水を60の目盛まで加えて
薄めてからうがいしてください。

60 mL



上の目盛
までが4 mL

下の目盛
までが2 mL

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



製造番号
使用期限

第3類医薬品

ポビドン
ヨード製剤

**細菌・真菌、
ウイルス
などを**

殺菌・消毒

ケンエー

うがい薬^S



130 mL 計量
カップ付

多種ノード
ポビドン

殺菌・消毒

ケンエーうがい薬S

ケンエーうがい薬S

第3類医薬品

ケンエー

- * 使用上の注意のつづき
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLに薄めて、1日数回うがいしてください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) うがい用にのみ使用してください。
- (4) 使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください。

【成分分量】 100mL中

ポビドンヨード7.0g(有効ヨウ素700mg)含有
添加物：エタノール、L-メントール、サッカリンNa水和物、プロピレングリコール、香料

〈成分分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。



健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

のどの

ポビドン
ヨード製剤

殺菌・消毒

口臭の除去に

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

ケンエーうがい薬S

ケンエーうがい薬Sは、各種の細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 口内のひどいただれのある人。
- (3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。

*以下右側面へ

2506

01

1307



使用期限

健栄製薬