

**鼻かぜ(急性鼻炎)**

**アレルギー性鼻炎**

による諸症状の緩和に

**第②類医薬品**

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

**くしゃみ**

**鼻みず、鼻づまり**

**なみだ目…**

# オールP鼻炎ソフトカプセルA

オールP鼻炎ソフトカプセルAは「鼻かぜ」や「アレルギー性鼻炎」による「くしゃみ」、「鼻みず」、「鼻づまり」、「なみだ目」、「のどの痛み」、「頭が重い」などの不快な症状をやわらげます。

## ⚠ 使用上の注意

### ⓧ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人：前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

#### 4. 長期連用しないでください。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人の
- (4) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人
- (5) 高齢者
- (6) 薬などにより、アレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人：緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位  | 症 状                 |
|-------|---------------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ           |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振         |
| 精神神経系 | めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん |
| 泌尿器   | 排尿困難                |
| その他   | 顔のほてり、異常なまぶしさ       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状   |
|--------------------|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。           |
| 再生不良性貧血            | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。     |
| 無顆粒球症              | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。   |
| 急性汎発性発疹性<br>膿疱症    | 高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |

裏面もお読みください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【成分・分量】

6カプセル(成人1日量)中

| 成 分                       | 分 量     | 主 な 作 用                            |
|---------------------------|---------|------------------------------------|
| 抗ヒスタミン剤 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6.0mg   | 抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻みずのアレルギー症状を抑えます。 |
| 副交感神経遮断剤 ベラドンナ総アルカロイド     | 0.4mg   | 鼻汁・なみだ液分泌抑制作用により、鼻みず及びなみだ目を抑えます。   |
| 交感神経興奮剤 プソイドエフェドリン塩酸塩     | 120.0mg | 鼻粘膜血管収縮作用により、鼻粘膜の充血を抑え、鼻づまりを解消します。 |
| カフェイン剤 無水カフェイン            | 120.0mg | 脳の血管に働いて、頭重感をやわらげます。               |

添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、酸化チタンを含有しています。

### 【効能・効果】


急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重

### 【用法・用量】

下記の1回量を食後水又は温湯で服用してください。

| 年 齢         | 1回量      | 1日服用回数 |
|-------------|----------|--------|
| 成 人 (15才以上) | 2カプセル    | 3回     |
| 7才以上15才未満   | 1カプセル    |        |
| 7才未満        | 使用しないこと。 |        |

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方(シートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思ひぬ事故につながることがあります)



### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

### 本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室  
 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地  
 T E L (06) 6491-6222  
 電話受付時間：月～金（祝日を除く）  
 9:00～17:00

製造販売元  
**オール薬品工業株式会社**  
 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地