

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

発熱、さむけ、頭痛に

# ジキニン<sup>®</sup>顆粒エース 〈効くかぜ薬〉

第2類医薬品

ジキニン顆粒エースは、解熱、鎮痛、鎮咳作用などを有する成分に、更に生薬エキスをバランスよく配合した総合感冒薬です。

## 【使用上の注意】



### してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

#### 1. 次の人は服用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

\* (3)12才未満の小児。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

（眠気等があらわれることがある。）

#### 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

#### 5. 服用前後は飲酒しないでください。

#### 6. 長期連用しないでください。

### 相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)高齢者。
- (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5)次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
- (6)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

〔表面からのつづき〕

間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

かぜの諸症状（発熱、悪寒（発熱によるさむけ）、頭痛、のどの痛み、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み、鼻水、鼻づまり、せき、たん）の緩和。

## 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1 包	3回
12才以上 15才未満	2/3 包	
12才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

## 【成 分】（1包1.5g中）

成 分	分 量	はたらき
アセトアミノフェン	300 mg	発熱やのどの痛みを緩和します。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20 mg	気管支を拡張し、せきを鎮めます。
ジヒドロコデインリン酸塩	8 mg	咳中枢に働き、せきを鎮めます。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	1.17 mg	鼻水、くしゃみなどのアレルギー症状を抑えます。
無水カフェイン	25 mg	頭痛を緩和します。
カミツレエキス	111.1 mg	生薬から抽出したエキスで、他の有効成分の働きをサポートします。
ニンジンエキス	14.3 mg	
カンゾウ(甘草)エキス	150 mg (原生薬換算量750mg)	

添加物としてタルク、トウモロコシデンプン、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、デキストリン、白糖、ポビドンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

1) お買い求めのお店

2) 全薬工業お客様相談室

住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

電 話：03 (3946) 3610

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>